



豬仔阿仔
圖仔英阿

熱後(夏季約一個月、冬季約二個月),以澄清液加水三十至五十倍施用,愈稀愈好,每十至二十天施一次。(鄭達文)

可剪除。
檳榔樹冠發育不大,定植距離普通只二公尺左右。
種在果園茶園四週,或宅前宅後的檳榔,多不另施肥。氮肥過多,常反使結果減少。
栽檳榔而兼植薯葉時,可在薯葉根旁施肥,檳榔自然就可吸收肥料。多用花生餅、蓖麻餅等,酌加過磷酸石灰。

檳榔易受圓介殼蟲為害,可用夏油乳劑(四十五至五十倍),或松脂合劑(冬季約二十五倍,夏季約四十至五十倍)防治。(黃劍臣)

臺灣的髓

臺灣的髓(甲魚)大致在五月至八月間產卵,每頭雌髓每次產卵二、三十個,在產卵期內約產三次至五次。
髓卵通常在砂穴中孵化。砂穴需要保持適當的溫度。砂溫在攝氏二十五至三十度,需五十天左右孵化。

洋蘭所需養份很少,栽培時所用的栽培材料,已可供給,並可向空中吸收一部份,所以,在栽培未有經驗以前,最好不用肥料,有相當經驗後,再慢慢試用少量肥料。假如肥料施用過多時,容易爛根傷花傷葉,使生長不正常,要特別注意。
施肥時期,以生長期,具備高溫、長日、溫度適當、通風良好等條件,春夏之間(除溼暑期)為宜。至於施肥的方法,因蘭花種類不同略有差異,用化學肥料時以 Hyponex (蘭花專用肥料)為宜。腐熟肥料以二斤豆餅泡一斗水,放在避雨處,等腐熟後(夏季約一個月、冬季約二個月),以澄清液加水三十至五十倍施用,愈稀愈好,每十至二十天施一次。(鄭達文)

蘭花的施肥

髓卵用孵卵器孵化時,可將卵埋入二寸左右經消毒的河砂。為使河砂潤濕,可使用膠管,內裝棉心,一端置於砂中,他端通水槽。孵卵器保持溫度在攝氏三十度,約四十天左右即可孵化。
剛孵化出來的小髓,容易受傷害,需要養在小容器中,用紅蟲、孑孓或水生蚯蚓等飼餵。稍大後,應按大小分別飼養,否則會相互殘食。(唐允安)

國立臺灣大學獸醫學系教授 劉榮標博士推薦

用請猪母的 ← 血 貧

糟 儉

乳 舞

命寧安猪

越卓効功片一日一

品聖的疫肺、痢白猪子防預

廠物藥畜家春鴻

六之號八一安長鎮橋板縣北臺

號一一八三第灣臺金儲撥劃

說明書 備索