

小果像「小指頭」大小時，極相當然也不例外。下雨後土壤潮潤，如天氣已轉晴，沒有大雨的預兆，這時施肥很適宜。（蔡致謨）

士林可種香樹

不宜種植桃樹

【問】：一、香櫞（或稱爲香丸）（其果實形如佛手，樹如柑橘類者）。種植有何價值？有何用途，銷路如何？二、種植應選何種土壤，今擬於士林、陽明山一帶種植是否適宜？三、在士林附近一帶，是否適宜種植桃、李樹，或梨？是否可種葡萄？（士林鎮邱紹鴻）

【答】：香櫞，一名香園或香丸，與佛手同爲柑橘類的原科。二、與其他柑橘類一同，砂質壤土至黏質壤土皆適宜，士林、陽明山一帶適於種植。三、士林、陽明山一帶，本地品種的李，或本省引進化的葡萄品種，如奈加拉等，不適宜於種植桃。至于梨樹，如橫山梨，勉強可以栽培。（蔡致謨）

水稻行間移栽黃麻

【問】：豐年九月期的黃麻樹仔栽培法，說得很明白，但是關於刈稻情形有下列二問題，請指示。

一、刈稻機可以不可以進入？

二、刈稻後及脫谷後的稻草如何處理？

（新竹縣中埔鄉莊傳來）

【答】：（一）第一期水稻收穫前，在其行間移栽黃麻，從事割仔栽培時，爲便利之期水稻收穫，在田間脫粒起見，應每隔相當距離，預留稻道，水稻連繩六行間不移栽。在第一期水稻收穫後，先將該通道之水稻收穫，隨即將脫穀機械推入通道，隨收或其它空地，晒乾作燃料、飼料或造紙原料。（季景元）

茭白繁殖用分株法

【問】：一、我有山麓水田二分，終年有

水，欲利用種菜，但水難排除。請示告水田可種何種菜類？其種法如何？（木柵鄉老泉村劉源華）

二、我在去年買了一塊水田，可種禾筍的，也有誰的？我不能分別種類，請告知。

（臺東縣池上鄉張汝楨）

【答】：一、關於山麓水田，可種茭白（或稱茭白筍）慈姑，及芋頭等。茭白筍之種植以種在富於機質之粘壤土的水田爲最相宜。繁殖法採用分株法。二、三月間耕起土地，施液肥等以爲基肥，開一星期灌水數寸，再細爲耕耘耙平，乃自舊株取新生之苗植之，每株一苗，行株距二尺許，每栽植二行至十一月即可收穫。

慈姑及芋頭之栽培法，請查閱豐年。二、茭白筍（禾筍）現在臺灣的品種有下列三種：①白殼—晚生大型。②赤殼—中生。③青殼—早生小型。茭白筍爲雌雄同株，無雌株雄株之分。（黃浦）

排水不良之地 不宜栽培木瓜

【問】：南部每天下雨，本人所種植的木瓜（雜交種）二百多棵樹身非常強健，排水也非常好，不知如何葉色變黃而落下？不知是何種病，有無防治方法，懇請指教。（嘉義縣羅文標）

【答】：連續下雨葉色變黃落下，還不多見。普通葉部變黃依次落下，在集水數十分鐘後在根部土常是如此，砂壤土需要較長時間才會使葉變黃。雨水浸在木瓜根部時間較長，初期是屬於生理病害，使根部組織鬆軟；後期病菌由土壤侵入根部，病害才開始漫延，促成長根部腐爛。排水雖然好，因爲雨大連續不停，應將栽培地溝開深，同時將週圍排水系統疏通，使水很快的排澆完。應特別注意，凡是排水不良的地方，決不要冒險栽培不瓜。（戴邦本）

一、巴拉松HO—Ekatox50 含巴拉松五〇% 乳劑。

特點：原液淡藍色，稀釋後清白，成分標準，殺蟲力強大。

二、益加津—Ekatin—防治蚜蟲，紅蜘蛛等最新有效劑可代替馬拉松乳劑，而得兼治因使用馬拉松引發之紅蜘蛛等蟲害。防治，柑桔黃龍病，棉花、大豆、落花生、蔬菜等之蚜蟲，紅蜘蛛等如每隔二十三星期撒佈一次連續使用則可達到防治目的。

特點：藥效長可維持二十三星期，比馬拉松藥力廣大，硫磺合成之殺菌兼殺蟲劑。

三、殺也特—Thiovit—最新科學方法製成石灰硫磺合成之殺菌兼殺蟲劑。

防治；白粉病，凡於草，蕃茄，馬鈴薯，西瓜，甜瓜，木瓜，花卉柑桔類瘡痂病，象皮病，油脂病，銹壓蟲，紅蜘蛛，大豆，菜豆，茄子，瓜類等病蟲害防治均有效。比石灰硫磺效能大五—十倍，價格低廉不損傷噴霧器。

四、好寶粉—Copper, Sandoz—

防治；水稻稻熱病，柑桔類砂皮病，潰瘍病，瘡痂病，黑星病等葡萄，露菌病，黑豆病，茶，茶餅病，類，露菌病，炭疽病，蔓枯病，蕃茄，疫病，棉花，角斑病，薄荷，銹病，白星病，菌核病等效能著大。特點：藥效長，可保持三—四星期間藥效。

五、蝸立死—Ariotto—殺蝸牛飼餵劑
每平方公尺撒佈一〇—十五粒，蝸牛自會前來就食立死，爲農作物，菜園，花圃等防治蝸牛侵害之最有效劑。

瑞士山德士農藥廠駐臺代表處—臺北郵箱八七八號

臺灣總經銷處

臺北市南京西路二三三巷三號
電話四三三四三七號

全省各地青果合作社，農藥，種子行均有出售
說明書附郵二角向臺灣總經銷處索取即寄