

柑桔園間作大豆

——勤瑞楊 鎮湖溪縣化彰

我在民國四十七年的七月間，利用栽植一年半的柑桔園行間間栽三國大豆。下面是我的間作經過：

間作 民國四十七年七月十日(即大暑前)播種。點播，每穴二粒，共用種子二公斤二公兩。

距柑桔九十公分，以行距五十公分，株距二十五公分下播。播種後覆蓋腐熟堆肥。

施肥 因為柑桔園土壤肥沃，除施用二十二公斤的過磷酸鈣外，沒有再施用其他肥料。

管理 因柑桔園地勢較高，播種後第七日，子芽發出後，在夜間施行澆水一次。以後因遇雨期，沒有再澆過水。遇大雨時要注意排水。

中耕培土 在乾燥期需要中耕除草，以防水分蒸發。在生長初期(七月三十日)實施第一次除草及淺中耕培土。八月十五日行第二次的中耕除草及培土。


補植 在七月二十七、二十八兩日，即幼苗生長到十公分時舉行補植。

病蟲害防治 在播種後六十天發現大豆的葉片呈褐黃色(如火燒狀)，經農會指導員說明是露菌病，我隨即向農會購買「大生」粉一磅，加添少許展着劑噴射。以後每隔十五天連續噴射二次，效果很好。

為防治大豆潛葉蠅及潛蛙心蠅，在播種後二十天噴射八百倍「安特靈」液。以後每隔十五天噴射一次，共噴射三次。第四次噴藥因已迫近收穫，改用一千五百倍「馬拉松」。

收穫 十一月十二日收穫，共計採收二百三十公斤。

柑桔園間作三國大豆，避免了柑園表土的曝露，保持土壤中的水份，節省柑桔園的除草工作，同時還收穫了二百餘公斤豆子，真是一舉數得。所以我希望農友們，您如有定植一至三年的柑桔園時，不妨照我的經驗一試，必定將有更好的收益。



友農勤瑞楊



中農化五廠出品

標準成份藥農 優良品質保證

巴拉松乳劑

PM乳劑

安特靈乳劑

馬拉松乳劑

大生七十八粉劑

魚藤精 混合乳劑

總公司：台北市南陽街廿一號 電話三一六六〇 五廠台北縣景美鎮萬隆里

經銷處

- ① 臺北縣新莊鎮中興路
- ② 桃園縣龍潭鄉中正路
- ③ 新竹縣竹塹鄉中興路
- ④ 苗栗縣竹塹鄉中興路
- ⑤ 臺南市大東門外中興路
- ⑥ 嘉義縣竹塹鄉中興路
- ⑦ 南投縣竹塹鄉中興路
- ⑧ 彰化縣竹塹鄉中興路
- ⑨ 雲林縣竹塹鄉中興路
- ⑩ 嘉義縣竹塹鄉中興路

- ⑪ 南投縣竹塹鄉中興路
- ⑫ 嘉義縣竹塹鄉中興路
- ⑬ 嘉義縣竹塹鄉中興路
- ⑭ 嘉義縣竹塹鄉中興路
- ⑮ 嘉義縣竹塹鄉中興路
- ⑯ 嘉義縣竹塹鄉中興路
- ⑰ 嘉義縣竹塹鄉中興路
- ⑱ 嘉義縣竹塹鄉中興路
- ⑲ 嘉義縣竹塹鄉中興路
- ⑳ 嘉義縣竹塹鄉中興路