



庇蔭樹種以銀合歡、白花蜘蛛、印度田菁等豆科植物為宜。「可可」植株長成開花結實時，庇蔭樹即可砍去。

為補給有機肥，並遮蔽地面，保持地溫，「可可」樹下宜栽培覆蓋作物，如虎爪豆、苦勞豆、爬地莖等。

「可可」的栽培密度因品種及土質不同而有差異。Kreolen 品種的株距，以三至四公尺為宜。Frendling 品種的株距，以四至五公尺為宜。定植穴直徑及穴深，各為五十至一百公分。

穴掘好後，充分施用腐熟的糞肥及堆肥，然後移植，移植時切勿露出直根。

幼株期應注意中耕除草。「可可」為淺根作物，中耕不宜過深。

肥料以豆餅、過磷酸鈣、硫酸銨、堆肥、石灰等為宜。

肥料施用時期，每年分三次，第一次於五月下旬，第二次於九月中旬，第三次於一月下旬施用。

各年生植株施肥標準如下(單位：公分)

肥料種類	氮	磷	鉀
一年生	二〇〇	一〇〇	一〇〇
二年生	三〇〇	一四〇	一四〇
三年生	四〇〇	一八〇	一八〇
四年生	五〇〇	二二〇	二二〇
五年生	六〇〇	二六〇	二六〇
六年生	七〇〇	三〇〇	三〇〇
七年生	八〇〇	三四〇	三四〇
八年生	九〇〇	三八〇	三八〇
九年生	一〇〇〇	四二〇	四二〇

「可可」定植後四至五年開始結果，十年為最盛期。如管理妥當，可繼續採收二十五年。(劉文慶)

二，四—D 與番茄

用二，四—D 處理番茄，時間不可過早。假如處理過早時，小花根本不會發育而漸漸枯萎。

假如處理過遲，例如小果時處理，成績較未處理者好，但是果實內有種子，未變小果前處理的是沒有種子的。

二，四—D 也可用噴霧器噴射，不過應該注意，噴射時花穗後面應該用紙板遮擋，否則藥液噴至葉面，會引起藥害，因此仍以採用浸漬法比較方便。

用二，四—D 處理木瓜，可獲得無種子之木瓜，但產量並未增多。用二，四—D 處理的果實，對人體是無害的。(譚靜吾)

國立臺灣大學獸醫學系教授 劉榮標博士推薦

猪安寧命

用請猪母的 血 糟 乳 養

越卓効功片一日一

品型的疫肺、痢白猪子防頑

廠物藥畜家春鴻

六之號八一安長鎮橋板縣北臺
號一一八三第街臺金儲撥劃

說明書 備索