

# 瓜實 蠅是 大害 蟲！

——山 錫 李——



果的果皮，產卵在果皮下。卵經兩日便孵化為白色的幼蟲，在瓜果內蛀食。

本省的農友把瓜實蠅叫作「瓜蜂仔」，這是為害瓜類最嚴重的害蟲，胡瓜(刺瓜)、越瓜(籬瓜)、絲瓜(茶瓜)、南瓜(金瓜)和香瓜等被害最多。除此以外，還為害番茄和香蕉。本省每年瓜類被瓜實蠅為害的損失，約在百分之三十左右。

### 瓜果彎曲腐爛

通常當瓜類開花結果時，瓜實蠅成蟲(蜂仔)便飛來產卵。成蟲身體的末端，有一枚產卵管，刺破瓜類幼

。被害的瓜果，輕時變成畸形，如彎曲或生長緩慢早熟等。嚴重時便腐爛落地，老熟的幼蟲入土中化蛹(變「酒瓶」或「土豆仁」)，經十日左右羽化為成蟲，過一段時期後，又飛回瓜園產卵為害。

### 使用兩種藥劑

防治瓜實蠅和防治其他害蟲不同，要用兩種藥劑同時配合才有效。

比例與配合：用二五%可濕性「馬拉松」粉劑一兩，水溶性蛋白質一兩，和水四百兩，或按這樣的比例(一：一：四〇〇)配合。

配藥時，先將可濕性「馬拉松」粉劑倒入桶中，加入少許的水，調成糊狀，再加半量的水，攪拌，同時將水溶性蛋白質加入，再將其餘半量的水倒進去，繼續攪拌一分鐘左右，才倒入噴霧器準備噴射。噴射方法：在瓜類開花的時候，將上述配合好的藥劑，噴到瓜株中段的葉背或葉面上。瓜類的頭部和末端都不必噴，約噴全株的三分之一便可。噴射此藥後，瓜實蠅的成蟲(瓜蜂仔)便很快飛來吸食，牠所喜歡吃的是水溶性蛋白質，但同時也把有毒的可濕性「馬拉松」吃進去，於是在數分鐘後，便見「瓜蜂仔」中毒，紛紛落地死亡。

噴藥時期：噴藥一定要在瓜的幼果未被叮(未被產卵之時)以前才有效。因此在瓜開花時便要開始噴藥。以後每隔五天噴一次。

每次噴藥時間，應在上午九點左右至十一點最適當，因此時是「瓜蜂仔」活動最多的時候，效果最好。若噴得太遲，因幼瓜已被「蜂仔」叮了，雖然「蜂仔」被殺死，也是沒有益處的。假如噴藥後逢下雨，應在第二天再噴一次較好。

### 注意事項三點

- ①「馬拉松」一定要用可濕性粉劑，不能用乳劑。
- ②調配藥劑時，一定要按上面所說的方法進行，要兩種藥劑都加進去才有效；單用任何一種都無效。如單用水溶性蛋白質，被害還更嚴重。
- ③「馬拉松」是在蔬菜上應用最安全的藥劑，它的效果很快，藥效維持時間約在四至七日之間，是防治瓜實蠅最理想的藥劑，希望不要用它劇毒性的藥劑代替，以免發生危險。

## 高產系統 種雛種蛋

以郵政服務精神保證

純乾鷄糞

代雜交種

高產 95% 蘆來一

紐漢西

黑田系 蘆花

岩谷系 來航

價格廉宜

品種優良

如蒙賜顧請撥郵政劃儲(儲蓄)帳號(免滙費)  
價目表函索即寄

郵政員工福利農場養鷄場

場址：臺北市新店大崎脚郵政橋