

夏播

萬苣

菠菜

必需

——生進王——

茅催的苣萬

與其他幾種秋季蔬菜一樣，萬苣和菠菜（菠蘿菜）也是栽培愈早收益愈好的。可是這兩種菜種，在高溫下是不發芽的；假如要提早播種，必需用人工催芽，才能成功。

萬苣的催芽方法有二種。（一）先將種子浸漬於一千倍的「烏斯普龍」液內消毒一小時，然後將種子裝入布袋或其他適當的容器內，吊在水井內，使袋子靠近水面，使種子吸收適當的水分。這樣經過二、三天，種子就開始萌芽了。將剛剛萌芽的種子取出，播於經過一千倍「烏斯普龍」液消毒的苗床；最好利用消毒種子的殘液來消毒苗床。（請看左圖右）

（二）將種子先浸水，使種子吸收水分後，貯藏於攝氏四度的低溫環境下五至六天，然後播於經過消毒的苗床。假如附近有製冰淇淋的設備，或有簡單的冰箱可以利用，可將種子夾在「吸水紙」內，貯藏於冰箱內四至五天，然

後播種。播種後苗床須保持適當的濕度。（請看左圖中）

波菜種子需先浸漬於「烏斯普龍」一千倍液二小時後開始催芽。普

茅催的菜菠

通是利用土窖或陰涼的場所（溫度都不超過攝氏二十五度）催芽。如能經

常保持溫度攝氏二

十度以下更好。

將經過消毒的種子（

或浸過種的種子）放置

於草蓆或竹籃上，厚約三

公分，種子上面用潮濕的

草蓆覆蓋，防止種子水分

迅速蒸發。一天之內須用手混拌種子一至二次，使全部種子保持一樣的濕度。

覆蓋的草蓆必須經常保持濕潤的狀態。


經過四五天，種子

開始發芽。注意在芽還不

太長時播種。在播種前一

天灌溉一次，或即刻整地

即刻播種。（請看下圖）



逐步茅催的（左）菜菠與（中及右）苣萬

一致養雞・豬・鴨的各農家的好消息— 防治貴家禽畜疾病、把牠們 餒肥養大、增產優良的蛋・肉

這就是增加貴家收入唯一的近路！

費用僅小，用法簡便——ロメジンソーダ與ベキシン只要溶於禽畜的飲料水或混入飼料中就可達成目的。請立刻試用。

最新禽畜驅虫藥

動物用



預防／治療，雞病的特效藥

動物用



對家雞感染的一切疾病有顯著優秀的功效。雞在籠時尤易染病，這時期給與ロメジンソーダ，預防的效果更大。

〔包裝〕 50公分，100公分，100片瓶



田辺製薬

全島有名藥店發售