

夏播

萬苣

菠菜

必需

催芽

——生進王——

芽催的菜菠

後播種。播種後苗床須保持適當的濕度。(請看左圖中)
菠萊種子需先浸漬於「烏斯普龍」一千倍液二小時後開始催芽。普通是利用土窖或陰涼的場所(溫度都不超過攝氏二十五度)催芽。如能經常保持溫度攝氏二十度以下更好。

將經過消毒的種子(或浸過種的種子),放置於草蓆或竹簾上,厚約三公分,種子上面用潮濕的草蓆覆蓋,防止種子水分迅速蒸發。一天之內須用手混拌種子一至二次,使全部種子保持一樣的濕度。覆蓋的草蓆必須經常保持濕潤的狀態。


經過四至五天,種子開始發芽。注意在芽還不太長時播種。在播種前一天澆水一次,或即刻整地即刻播種。(請看左圖)

芽催的苣萬

與其他幾種秋季蔬菜一樣,萬苣和菠菜(菠萊)也是栽培愈早收益愈好的。可是這兩種菜種,在高溫下是不發芽的;假如要提早播種,必需用人工催芽,才能成功。

萬苣的催芽方法有二種。(一)先將種子浸漬於一千倍的「烏斯普龍」液內消毒一小時,然後將種子裝入布袋或其他適當的容器內,吊在水井內,使袋子靠近水面,使種子吸收適當的水分。這樣經過二、三天,種子就開始萌芽了。將剛剛萌芽的種子取出,播於經過一千倍「烏斯普龍」液消毒的苗床;最好利用消毒種子的殘液來消毒苗床。(請看左圖右)

(二)將種子先浸水,使種子吸收水分後,貯藏於攝氏四度的低溫環境下五至六天,然後播於經過消毒的苗床。假如附近有製冰淇淋的設備,或有簡單的冰箱可以利用,可將種子夾在「吸水紙」內,貯藏於冰箱內四至五天,然後播種。



驟步芽催的(左)菜菠與(中及右)苣萬

——致養雞·豬·鴨的各農家的好消息——

防治貴家禽畜疾病、把牠們
餒肥養大、增產優良的蛋·肉

這就是增加貴家收入唯一的近路!

費用僅小,用法簡便——ロメジンソーダ與ベキシン只要溶於禽畜的飲料水或混入飼料中就可達成目的。請立刻試用。

最新禽畜驅虫藥

預防/治療,雞病的特效藥

動物用

動物用



禽畜也和人一般,體內若有蛔虫寄生,決不能肥大。請把ベキシン每月一次定期的給貴家禽畜吃而看牠們一天比一天的肥大。

(包裝) 30公分, 100公分, 500公分,

對家雞感染的一切疾病有顯著優秀的功效。雞在雛時尤易染病,這時期給與ロメジンソーダ,預防的效力更大

(包裝) 50公分, 100公分, 100片他



田辺製藥

全島有名藥店發售