

識知友麓

富米農與西樂生

防治蓬萊稻熱病，應用「西樂生石灰」或噴射「富米農」片（每一片加清水六公升），每公頃施用量前者為三十至四十公斤，後者為一千至一千五百公升。

稻正開花時期中，不可施用「西樂生石灰」，但在齊穗後撒佈，是不會損害稻穗的。「富米農」與「西樂生石灰」施用於在來稻，都會引起藥害。所以，對在來稻的稻熱病，至目前尚無最適宜的殺菌劑，現正由有關機關繼續研究中。「西樂生石灰」可與BHC混合使用，但混合後不要放置太久。混合量應視病害及蟲害為害程度而定；如稻熱病發生較多，害蟲發生少時，BHC混合較少量即可。

「富米農」片對稻熱病的防治，經試驗認為效果很好，但是對其他病害的效果，在本省還沒做過試驗，在該藥包裝盒上說明的，是在日本使用的情形，在本省尚待研究機關試驗才能決定。

「富米農」不宜施於瓜類，假如施用失當，容易引起藥害。如為防治瓜類病害，應用四百倍「大生七八」比較妥當。（洪章訓）

紅皮甘蔗

紅皮甘蔗在種植前可用千分之一的「殺樂生」浸種消毒，時間為三十秒。適宜的栽植株距為八寸至一尺二寸，行距為四尺至四尺二寸。

施肥量因土質及土壤肥沃程度而異。普通宜施多量有機質肥料，如堆肥、廐肥等。假如每公頃施用堆肥二萬公斤，需要補充的三要素量為氮肥一百五十公斤，磷肥七十五公斤，鉀肥一百二十公斤。全部堆肥與磷肥及三分之一的氮肥與二分之一的鉀肥做基肥施用。三分之一氮肥及三分之二鉀肥於小培土時做第一次追肥施用。其餘三分之一的氮肥，於大培土時施用。蔗田可施用氧氮化鈣。

紅甘蔗生育期中主要病害為嵌紋病，可選用無病蔗株作苗。主要蟲害為綿蚜蟲，可用百分之一BHC粉噴殺。（李寬命）

豆仔落


豆落在本省南部栽培較為普遍，糖拌一帶最多。落部可供食用，豆子含有毒素，不可食用。

如果需要種子，可向南部地區種子商或農會洽購，播種期為三至四月，或七至八月。三、四月間播種，可在九至十一月間收穫。七、八月間播種，可在十二月至翌年二月間收穫。詳細情形請參看本刊三卷二十二期與四卷四期。

韓國的改良「牛擔」

本刊第十卷第五期曾經介紹過本省的竹製「牛擔」，韓國牛車上所用的「牛擔」，大致也和本省的一樣，因為牛全靠肩部來拖拉牛車，牛肩容易受傷，運貨速度緩慢，所以他們最近設計了一種改良「牛擔」，據說，不但可以多加載貨物，增加行車速度，而且還可以延長牛的使役年齡。

這種改良「牛擔」，利用「拖鍊」（左圖甲）代替過去的「車橫」，擔負拖拉的工作。原來的「車橫」（左圖乙），改用來導向，所以，「車橫」是連結在「鞍」上的。這樣連結，使「車橫」容易向前後左右，或上下



「擔牛」良改的國韓

經過服用此藥後！

未服用此藥前

奇效

經農林廳送交台灣省畜產試驗所試驗結果證明：一次見效，效果100%。絕無副作用。

比配拉淨製劑豬驅虫新藥

豬仔面蟲藥

台製牌商標

用法簡便且價錢又便宜

每隻小豬藥費僅需二至三元

小豬，體重每公升用0.5瓦中豬用0.12瓦大豬用0.1瓦，計算以混合飼料中做一食，不需再給任何高劑，三五六天中可以把蟲驅除，飛可使豬隻快肥又快大。

農會、藥房、飼料店均售

製造：批發：臺南市 德生西藥房 民權路133號

包裝 定價

20公份	1000
100	4500
450	18000

訂購：郵購南字30014

徵求經銷處

情形完全不同！