

注意 防止 森林 火災

燒燬森林是犯法的

夏季天氣炎熱，草木乾燥，極易引起森林火災，根據歷年森林火災統計，夏季佔甚高比率。省府特頒令各縣市政府，除嚴密防範外，並頒發森林防火要點，對於村里民大會，動員月會以及其他各種集會場所，向民衆作廣泛的宣傳，俾能提高大家的警覺，以減少森林的火災。省頒森林防火要點內容如下：


- 一、在山地應注意火燭，不可隨便拋擲火柴、烟頭。
- 二、吸烟後要用腳把烟頭踏熄。
- 三、不可擅自引火開墾，如果

確係開墾，請先向地政機關申請，經地政機關核准後，方可開墾。在山地有不得已焚火取暖、煮飯、或掃墓焚香燒紙時，應該萬分小心，俟餘燼確實熄滅後，始可離去。五、不可在林地內任意打獵。六、發現森林火災，請速通知附近山林工作站或警察派出所。

按照森林法第五十一條規定：放火燒燬他人的森林，是要處三年以上十年以下的有期徒刑，不小心燒毀他人的森林，也要處二年以下的有期徒刑。除了請農友確實注意，防止森林火災外，並勸告你的隣人，共同保護森林。



林義嘉中義的埔埔採果道樹。(攝和稿呂)



檬果行道樹 遮蔭又生產

嘉義臺南等縣境內，很多鄉鎮，栽培檬果或其他果樹，作為行道樹。一方面綠化農村，造成美好的環境，行路人可以遮蔭，同時，生產的果品，出售後可以作為地方建設的經費，真是一舉數得。這種行道樹因為是屬於鄉鎮的己財產，行人也特別愛護，絕少有任意摧殘或偷摘果品的情形。

上圖是嘉義市至中埔吳鳳廟大路旁栽培的檬果行道樹，正在採收的情形。(福和)

林業信箱

竹林開花原因未明
可砍伐老竹後施肥

【問】：本人經營數百株麻竹，每年施用氮化鈣。到了發芽時期，肥上加蓋新土，可助地土的熱氣，每年生產的都很早，可得到高價的機會。近來不能得到足夠的氮化鈣，請問有無其他可以增加地土的熱氣的方法？又時常發見麻竹開花「敗頭」，請問防止方法？(宜蘭縣冬山鄉大進村劉明輝)

【答】：氮化鈣促進發芽，是因為肥效的關係，並非增加地溫，所以改用其他化學肥料，肥料效果是一樣的。一般化學肥料多較氮化鈣為速效，施用可比氮化鈣遲二、三星期，此後更于九、十月間翻竹株間土壤，壅置堆肥、厩

肥落葉、人糞尿等。竹之開花原因尚未完全明瞭，倘無有效的預防法。凡見竹勢衰退，有開花趨勢的，可伐去老竹(或皆伐)，在跡地施大量人糞尿堆肥厩肥等，恢復地力。(黃希周)

印度紫檀木材珍貴
臺灣南部已經推廣

【問】：本人愛好造林，貴刊第九卷二十二期關於印度紫檀之刊載，特別引起我的興趣。下列問題，請予解答：

- ① 種子及苗木何處有售？
- ② 抗風力強否？
- ③ 有沒有保持地力之能力？
- ④ 種植後幾年可砍伐？
- ⑤ 經濟價值如何？有什麼用途？
- ⑥ 砍伐後可否留頭萌芽？
- ⑦ 在新竹峨眉鄉地區內可否種植？(新竹縣峨眉鄉富興村蘇煥湘)

【答】：① 臺灣省林業試驗所有少量苗木推廣，請試向該所推廣課申請配給。南部各縣政府亦已開始推廣，但北部地區目前尚未推廣印度紫檀。② 抗風力相當強，除海岸地帶外，均可栽植。③ 對地力保持之能力普通。④ 種植後十二、十五年可開始開伐，三十年可主伐。⑤ 經濟價值甚高，為世界著名的貴重木材之一。⑥ 用途：高級傢具、船艦、裝飾、彫刻及一般建築用。⑦ 砍伐後可以萌芽法更新。⑧ 新竹縣竹東國校有九棵大木，生長甚佳，故在峨眉地區諒可種植。(林文鏡)