


請使用!!

金雞牌

日本魚粉

快大 各處 多利

養雞、養鴨、養豚
最理想的蛋白質飼料



臺灣總經理
建福貿易股份有限公司
臺北市信陽街二十三號
電話：25915, 25916

【問】：「阿蘇一號」大豆，是由日本引入，屬矮性種，只有早熟的優點，適於本省中南部栽培，一年春、夏、秋三季都可以播種。雲林地區播種期：春播二月上旬至三月上旬，夏播七月上旬至下旬，秋播九月下旬至十月上旬。(劉文慶)

黃豆飼料煮過較好

青菜飼料可以不煮

【問】：本地區目前是飼料困難時期，我自己種青荳類飼料甚多，而且黃豆種亦多。目前無其他飼料可配，是否可以將黃豆粉碎，不混其他飼料生乾飼豬，再配青菜飼料生飼，其效果如何？(金沙鎮黃慶隆)

【答】：黃豆作飼料還是煮過比較好，因為不經高溫的飼料餵豬，或將引起下瀉。青飼料則不必煮過，以免失去營養份。(余如桐)

雜草可代青飼料

注意避免傳染病

【問】：今有一疑難問題，請予答覆。水中生長的蝦草以及鳳梨草，做人所飼養的雞

很喜歡吃這些草，是否可用以替代青菜？(湖口鄉戴文淳)

【答】：水中生長之雜草(如你所稱之蝦草以及鳳梨草)雞隻喜歡吃，是可以代替青飼料(青菜)之用；但須注意你取雜草之地方附近有無雞隻飼養，或在水草處有無人在那裡屠殺雞隻。因為傳染病菌在水中傳播很快，所以利用水草時，上述問題應加考慮，以避免疾病之傳染。(李登元)

雞隻幼雛注意保溫

避免太擠不宜淋濕

【問】：①做舍所養紐漢西和蘆花雞計數十隻。近日發現病群中幾隻不正常，一無元氣，閉眼欲睡，嘔食食滯，頭及腳皆麻痺，行步不穩，翅膀垂下，糞便淡黃綠色水樣一，於是即時給與藥品治療，隔五小時後並無起色反而加重，因之再予藥品治療，但屢屢積餘多量飼料未消化。診斷此病與傳染性下痢及新城雞瘟有類似之處，請問究竟是何病症，有何特效藥可防治？②出殼後約六天之

幼雛，突然食慾不振，肢體微垂下，愛飲水，糞便塗塞膠着周圍，並無白色，給藥治療無效，這是何病，有何特效藥可防治？③一個月內之雞雛是否亦需要日光浴(紫外線)以補助生長健康。被雨淋溼有何影響？是否影響致病呢？(屏東縣王新坤)

【答】：①據你所說的情形，你的雞隻可能是因「積食」而死。「積食」之雞隻應單獨予以將雞頭部份按摩，如很嚴重則應擠積食，使食物由口中擠出。擠出後宜單獨飼養，給與精軟的飼料，數天後再使之合群。②出殼後六天幼雛，據你所說的情形，可能是因溫度不宜，太冷太熱，均使幼雛發生堆擠現象，因堆擠引起消化不良以致腹瀉。所以幼雛在保溫方面應加以注意，避免太擠，就不會發生此現象，無須用藥。③出殼二、三日後之幼雛最好就有直接接觸陽光的機會，以促進其發育良好。幼雛不宜淋濕，如淋濕應即便乾，不然會使雞隻受寒體弱，而易致發生其他疾病而死亡。(李登元)

養產母雞應予淘汰

管理注意避免擁擠

【問】：我養有雜種雞一批，每日用稻谷、糙米以及剩飯、米糠之類飼養。因雞已月餘不生卵，現在正是生卵期，感覺奇怪。在晚上檢查雞的腹內時有卵，但至白天傍晚仍未生卵。再查腹內之卵已不在，這種現象有左列數項疑問，懇請賜教。一、以上所說生卵不正的母雞，是否有遺傳性？二、卵巢內的卵會變，有何藥可治療？三、對上述的母雞，應否開除？四、母雞腹部無毛，是否不宜飼養？(屏東住冬鄉羅禮和)

【答】：據你所說的情形，照常理判斷是不會的。不過有些惡癖的雞隻，易會把自己生下卵吞食下去。此外還有一種可能，清早雞隻產下之卵被老鼠搬走；關於上述問題，請多加注意。一、有惡癖的母雞是逐漸養成之壞習慣，應予淘汰。二、寡產的雞隻應予淘汰，無藥可供治療。你的說法，卵巢中原有卵變為無有，是不可能的。三、寡產雞應早予淘汰。四、母雞腹部無毛，不能斷定是太老，可能是太擠，被其他雞隻啄落。故在管理上應注意避免擁擠為安。(李登元)

可以乘座犁耕整地之

興農鐵牛牌 耕耘機

不怕水整天 24 小時可以不停工作

人人樂用

用戶最多



在三重埔座犁耕整地表演情形

簡介

- ①配裝美國最有名 B S 牌引擎
- ②犁耕深度 5—6 吋每甲地 10 小時
- ③拖車載重 3000 斤時速 20 公里

價格

- 本機、引擎農具全套、拖車、標準修理工具整套 20,190 元
- 9 馬力：2 號 B 型耕耘機 共計 20,190 元
- 7 馬力：2 號 A 型耕耘機 共計 18,890 元
- 乘座犁耕裝置 3,000 元

建昌鐵工廠 臺中市三民路 98-7 號
臺中市大智路 12 號