

◎「賽文」是，非有機磷，非氯化化合物。最低毒性，人畜無害新農藥



(經銷)

孚美行

臺北市漢中街一三七號三樓 TEL. 31449

華南貿易行

臺北：臺北市天水路 11 號 TEL. 47588

臺南：臺南市民生路102號 TEL. 2885

◎農友們！您們想知道，最新時代殺蟲劑「賽文」是什麼！！



賽文 SEVIN

各種農作物主要使用分量表

農作物	害蟲類	藥劑	藥劑使用方法
柑桔	角肩椿象蟲、粉介殼蟲	賽文50%可濕性粉	泡水1000倍即可噴藥，則（取10公分藥劑先用若干水液於量杯中泡散放入10公升噴霧器中裝滿水即可噴用）。每甲地每次噴藥不超過1~1.5磅為佳，每10天噴藥一次。
茶	枝尺蠖、霜降枝尺蠖	賽文10%粉劑 賽文5%粉劑	在美國於水果類噴藥，當天噴藥當天可收穫食用，但為安全起見於收穫前二星期停止噴藥以策安全。
	卷葉蟲、柑桔小枝尺蠖 蚜蟲、小白紋毒蛾	賽文50%可濕性粉	
香蕉	粉介殼蟲	賽文50%可濕性粉	泡水1,000倍（每隔1個月噴藥一次）
		賽文85%可濕性粉	泡水1,700倍（每隔1個月噴藥一次）
蔬菜 蕃茄	小猿葉蟲、菜蚜蟲、 ギンウワバ、黃條葉蚤	賽文50%可濕性粉	泡水1000倍（與上同樣配水）如小猿葉蟲幼蟲即以2000倍即可以防治。 播種第五天開始噴藥800倍，每星期噴一次，連續噴3~4次。
黃豆 菜豆 紅豆	夜盜蟲、豆蚜蟲、金龜子、椿象蟲、大豆潛蠅類	賽文50%可濕性粉	泡水1000倍（與上同樣配水）每十天噴藥一次為佳。
棉花	棉浮塵子、棉蚜蟲、棉象鼻蟲	賽文50%可濕性粉	泡水1000倍（與上同樣配水）每十天噴藥一次，若遇下雨則改為七天為佳。 泡水300倍 泡水500倍
水稻	浮塵子（ウンカ）、黑尾浮塵子、（ツマグロヨロバエ） 褐飛蝨、黃飛蝨	賽文50%可濕性粉	泡水1000倍~2000倍（則10L水中泡本藥） 5~10公分

家畜用牛狗貓兔等家畜家禽害蟲跳蚤蟲子等有效。