

### 種一紹介

# 菜椰花的生早極

— 郁 文 陳 —



(。好質品，生早極) 菜椰花生早極山鳳

本省的花椰菜生產期，通常自十一月開始。因為栽培很普遍，每到生產旺期，價格都很不安定。但是如能在適當時期栽培「鳳山極早生花椰菜」，就可提早十月以前採收，價格高，栽培利益很大。

## 熱耐熟早

於夏季早播栽培，而不適於秋冬季中播或

「鳳山極早生花椰菜」，是花椰菜中最早熟的品種，很耐熱，適

晚播栽培。  
「鳳山極早生」的花球雖小(平均重量約四百五十至六百公分)，但品質優美，且

曆七月十五日應市時，就在八十天前(四月二十五日)播種，五十天前(五月二十五日)定植。

## 種播月八

「鳳山極早生」雖是生性強健，但在夏季栽培，仍要切實注意管理，才能栽培成功。

在全省各地均可在五月至八月播種栽培。但最理想的播種期，為八月上旬至中旬，在這期間播種，發育良好，收量品質也都較好。五月以前或九月以後播種的，因為氣候較冷，容易提早抽苔，栽培成績不好。

「鳳山極早生」的種子，農林廳有指定採種圃，每年由鳳山熱帶園藝試驗所供給優良原種繁殖純良種子，栽培時，應向農會洽購確實的種子較為安全。

苗床宜選擇管理方便，排水良好的場所，施草木灰及細碎的腐熟堆肥，混和BHC粉劑作基肥。種子先行密播，播後六日子葉已展開但本葉未生出時移植一次。移植株距為行間十公分，株間六公分。


因株形矮小的關係，可以密植(每十公畝地栽三千株)提高單位面積的產量。  
自定植至採收，只需四十五天左右，因為在田間的生育時間很短，受風雨或病蟲為害的機會較少，而且土地利用很經濟，所需肥料勞力也較少，可以減低栽培的成本(一株的一切栽培資本約〇·三元左右)。  
它的播種適期很長(五月至八月均可播種)，而且在適期內播種的，都能在定植後四十五天左右開始採收，所以可以預定生產時期，提高栽培利益。例如要在農曆七月十五日應市時，就在八十天前(四月二十五日)播種，五十天前(五月二十五日)定植。

## 夏天常常有風颶 提早防備可消災


萬得詞  
小願圖



夏天天常常有風颶，該應即注意提早防備消災。



影有颶風，(實委)屬真，(看)看，(望)望，(希)希，(布)布，(台)台，(電)電，(各)各，(聽)聽，(收)收，(好)好。



頂若頂，愛聽風，漏時來，大雨落，(補)補，(緊)緊，(來)來，(時)時，(火)火，(意)意，(注)注，(火)火，(燒)燒，(層)層，(撲)撲。

移植後充分澆水，不需要覆蓋遮日。但移植三日後苗株行間應密鋪稻草，以防風雨。育苗期間絕對不可在苗床上面架設覆蓋膠布或稻草等防雨，因為這樣會使苗株徒長軟弱，定植後發育較差。

此外還應注意，育苗期間不可超過三十天，因為「鳳山極早生」的生育期間很短，育苗期間過久的老苗，定植後抽苔較快，收量和品質都不理想。

### 帶土定植

「鳳山極早生」的苗株，必需帶土定植。帶土定植的苗株，能在短期間內充分發育，提高品質和產量。  
定植地宜用高畦，畦寬一公尺，栽二行，株間四十五公分。  
夏季多雨，所以定植地必需為排水良好

\* \* \*

## 蓖麻品種以「佐久間」最好

屏東市張金品、竹山鎮孫大光、桃源鄉楊水行、古坑鄉蘇竹村，與斗南鎮詹炳乾等數位農友，先後來信詢問有關蓖麻的品種與栽培適期等問題，本刊請嘉義農學院試驗所史釋先生解答如下：

在臺灣栽培蓖麻，以「佐久間」品種收量最多，含油量也最高，如果需要種子，可向臺東各種子行洽購，每公斤市價，為六元二角五分，每公頃需要種子約二十公斤。

土性肥沃，表土深厚，排水良好的土地較為理想。種植地點，能避暴風，或有防風設備而陽光充足的地點最為合適。並應避免連作。蓖麻播種前約一個月，需先行深耕一次，並把雜草檢除，播種前細碎土塊，耙平地面，並開排水溝，然後播種。

山地栽培，假如坡度在百分之十五以下，須沿等高線耕犁。坡度在百分之十六至三十度以內時，應先築平臺階段，再行整地。

播種期在八、九月間，但是因地而異：東部地區，以八月中、下旬為最適宜。南部地區，以八月下旬、及九月上旬為最適宜。西部地區，以九月上、中旬為最適宜。北部地區，以九月中、下旬為最適宜。種子在播種前，用百分之十至二十的草木灰溶液，浸漬二至三小時，取出後立刻播種。適宜的行株距是：行距一公尺，株距五十公分。

播種法用：點播，平地以三角形播種，山地沿等高線種植，每次播種約三粒，各粒種子距離二至四公分，深度四至六公分。播種後立即用細土覆蓋。（史釋）

的肥沃砂質壤土。又因生育期間短的關係，化學肥料與堆肥都很重要。追肥應用速效性的，分多次施用才能使發育加快。

畦面敷草可減低地溫，幫助植株的發育，且能防止雜草繁茂，及畦面土壤的流失。又因夏季乾燥不定，應該注意排水和灌水。病蟲害方面，因為夏季病蟲害較多，雨後應充分施肥，並噴藥防止病蟲的發生。

### 預防日晒

夏季日光特強，最易使花球變黃，影響品質。所以在抽苔後，應每日巡視田間，覆蓋軟白花球，提高產品的品質。  
「鳳山極早生」自抽苔至採收，約二星期左右。因為高溫期花蕾發育較快的關係，花球的採收適期很短，所以寧可早採，以免花球過老而影響市價。


\* \* \*



等木若若  
若若若若  
若若若若  
若若若若  
若若若若  
若若若若  
若若若若  
若若若若



一風大  
風大  
風大  
風大  
風大  
風大  
風大  
風大



風大  
風大  
風大  
風大  
風大  
風大  
風大  
風大