

移植後充分澆水，不需要覆蓋遮日。但移植三日後苗株行間應密鋪稻草，以防風雨。育苗期間絕對不可在苗床上面架設覆蓋膠布或稻草等防雨，因為這樣會使苗株徒長軟弱，定植後發育較差。

此外還應注意，育苗期間不可超過三十天，因為「鳳山極早生」的生育期間很短，育苗期間過久的老苗，定植後抽苔較快，收量和品質都不理想。

帶土定植

「鳳山極早生」的苗株，必需帶土定植。帶土定植的苗株，能在短期間內充分發育，提高品質和產量。
定植地宜用高畦，畦寬一公尺，栽二行，株間四十五公分。
夏季多雨，所以定植地必需為排水良好

蓖麻品種以「佐久間」最好

屏東市張金品、竹山鎮孫大光、桃源鄉楊水行、古坑鄉蘇竹村，與斗南鎮詹炳乾等數位農友，先後來信詢問有關蓖麻的品種與栽培適期等問題，本刊請嘉義農學院試驗所史釋先生解答如下：

在臺灣栽培蓖麻，以「佐久間」品種收量最多，含油量也最高，如果需要種子，可向臺東各種子行洽購，每公斤市價，為六元二角五分，每公頃需要種子約二十公升。

土性肥沃，表土深厚，排水良好的土地較為理想。種植地點，能避暴風，或有防風設備而陽光充足的地點最為合適。並應避免連作。蓖麻播種前約一個月，需先行深耕一次，並把雜草檢除，播種前細碎土塊，耙平地面，並開排水溝，然後播種。

山地栽培，假如坡度在百分之十五以下，須沿等高線耕犁。坡度在百分之十六至三十度以內時，應先築平臺階段，再行整地。

播種期在八、九月間，但是因地而異：東部地區，以八月中、下旬為最適宜。南部地區，以八月下旬、及九月上旬為最適宜。西部地區，以九月上、中旬為最適宜。北部地區，以九月中、下旬為最適宜。種子在播種前，用百分之十至二十的草木灰溶液，浸漬二至三小時，取出後立刻播種。適宜的行株距是：行距一公尺，株距五十公分。


播種法用：點播，平地以三角形播種，山地沿等高線種植，每次播種約三粒，各粒種子距離二至四公分，深度四至六公分。播種後立即用細土覆蓋。（史釋）

的肥沃砂質壤土。又因生育期間短的關係，化學肥料與堆肥都很重要。追肥應用速效性的，分多次施用才能使發育加快。


畦面敷草可減低地溫，幫助植株的發育，且能防止雜草繁茂，及畦面土壤的流失。又因夏季乾燥不定，應該注意排水和灌水。病蟲害方面，因為夏季病蟲害較多，雨後應充分施肥，並噴藥防止病蟲的發生。

預防日晒

夏季日光特強，最易使花球變黃，影響品質。所以在抽苔後，應每日巡視田間，覆蓋軟白花球，提高產品的品質。
「鳳山極早生」自抽苔至採收，約二星期左右。因為高溫期花蕾發育較快的關係，花球的採收適期很短，所以寧可早採，以免花球過老而影響市價。



，災屬難聽
，一萬防預
，知，天一萬防預
，害受減備防提



，來若聽聽
，來聽聽聽
，內屆(留)帶家大好最



，喬喬軟瓜木
，了倒吹若瓜木
，笑見兼錢了無若