

# 你想提高甘蔗栽培的效益嗎？

## —秋植甘蔗園間作花生，將帶來給你一萬元額外收入—

近年來本省落花生需要量逐年增加，如能在蔗田間作花生，增加花生生產，自然是好事，但是必須注意栽培方法，才不致影響甘蔗產量太大。

秋植、春植，及宿根三種甘蔗，都可以間作落花生，下面先介紹秋植甘蔗間作落花生時，應注意的幾點。

### 輕鬆土壤 最為適宜

落花生喜輕鬆土壤，所以間作土地，以砂土、砂壤土最為理想，壤土次之，粘土不適宜。

在前作物如甘藷、胡麻等收穫以後，每公頃施用堆肥或厩肥約兩萬公升。  
基肥施了以後，為避免養分損失起見，立即開始整地。

整地方式以甘蔗為主，先翻耕耙平，再根據甘蔗行距一·二〇至一·二五公尺開行。甘蔗植溝不宜太深，溝底至溝頂十五至二十公分，同時每隔八至十二公尺開一橫溝。田區大的，每隔三十至五十畦邊需留兩行甘蔗位置開一縱溝，四周設環溝，以利排水。

### 甘蔗花生同時播種

甘蔗放種：在目前，甘蔗品種多用NCO三一〇，株距四十公分，八月底以前用斜插法種植，每

公頃約用雙芽苗二萬支。


落花生播種：甘蔗種植以後，隨即播種落花生。播種前，先把畦頂（即落花生之植床）耙平碎土，除去雜草。通常是每畦間作，在每一畦頂上播種落花生二至三行（最好是兩行）。假如種植三行，行株距為三〇×二〇公分，假如種兩行時，行距三十五至四十公分，株距十至十五公分。

在耙平的畦頂開淺溝兩條（如種三行即為三條）溝深五至八公分，用點播法播種。假如種子飽滿充實，土壤水分合適，每次只需播一粒種子，每公頃種子用量五至六十公升。

落花生品種用「臺南白油豆一號」，種子要先用藥消毒，通常用「賜保根」粉劑與種子充分拌和，一公斤種子用「賜保根」二至三公升。播種後視天氣晴明程度，略蓋薄土一、二公分。

### 補植·施肥·中耕培土

補植：甘蔗在植後兩星期內兩芽中無一芽萌發時，才需要補植。落花生在播種後三至五日發芽，假如缺株，應立即補植。



## 嘉 義 清河種子行

歷史悠久，名不虛傳的種子專家，「清河種子行」本年度又改良出品多項優良新品種，本年度農曆四月有一位農友栽培第一項實效的「新改良早生30天青粉葉包心白菜子」二萬兩，約栽培二分地於六月旬收穫，計共五十餘日期間，獲得壹萬餘元的收益，其他有栽培該品種的農友均同樣獲得同等的收益，此是優良品種所得也，尚多項新品種繼續供應希各位農友們勿失良機，多多利用，清河種子行之各項品種雖是優良，但年年仍繼續改進，各項品種逐年優益，本年度品種比去年度更加優異也，各項夏秋季優良品種提供於下：  
新改良早生30天青粉葉包心白菜、早生28天黃葉包心白菜、早生30天黑葉包心白菜、早生35天黑葉包心白菜、早生50天純白結晶花椰菜、早生55天純白結晶花椰菜、新品種50天早生雪白花椰菜、新品種中生早70天硬晶雪白花椰菜、早生40日長種馬耳松菜頭、大白松菜頭、冬瓜白菜頭、目瓜（臺中特選青皮白刺）、早生60天扁圓型甘藍菜、豆仔筍（正烏山扁圓型）、赤葉包心芥菜、早生黃心白骨芥菜、早生白葉白骨芥菜、大號白脚莞菜、長岡交配一號甘藍菜、三池中生甘藍菜、金澤結頭菜、金門結頭菜、日本長岡交配福壽二號トマト、日本長岡交配大型福壽トマト、美國派遜トマト、美國大五寸人參、美國大粒甜蕃椒、美國球型洋葱（巴比502）、清河改良大白菜、純正青江白菜、純正80天油甘菜、特大葉虎耳多荷、白粉葉格藍菜、丸子晚生高脚菠菜、柿型トマト、十石大豆、正蘇魯種木瓜。

其它各色種子陸續入荷，希照會。菌病特效藥，大生78及蟲害特效藥劑和噴霧器等在庫均備。  
敝行一九六〇年度「清河新園藝栽培法」已出版了，內容豐富各項品種有詳細的說明，是蔬菜栽培者的良友，請函索付郵票二元（工本費）即寄給。

### 清河種子行

嘉義市中正路四八二號  
電話：三五八四號  
劉發儲金嘉字第八〇〇三七號