

Pacific


最新最好家禽用藥劑

禽聖片 錠劑
A. C. M.

(俗名：紅藥片)

主治：鷄、火雞、鴨、鴿子、等傳染病細菌性疾。

主成份：氯徽素（抗生素）+三種磺胺劑
衛試藥字第 2390 號



經濟實惠
省錢省力
驚異效力
用者稱讚
嘉許獎狀
雪片而降

太平洋製藥廠

臺北市中山北路1段105巷90號 TEL: 47086

至六個月施第二次追肥。每公頃氮素二百公斤，磷素七十五公斤，鉀素一百五十公斤，兩次平均分施。

落花生在播後十五至二十日施追肥一次，每公頃氮素二十公斤，磷素三十公斤，鉀素四十公斤。

氮素重量乘五就是硫酸銨的重量，磷素乘五，五就是過磷酸鈣的用量，氯化鉀以鉀素乘二計算，中耕除草落花生播種以後，開花以前，應適時中耕除草，通常一、二次已足。中耕除草時，應同時整土，使落花生開花以後子房柄容易伸入土中。

落花花生生育期間，甘蔗應照常除草。因落花花生生長茂盛，纒蓋畦頂，雜草往往較單作時少，假如溝底株間有雜草，需用鋤頭或人工拔除。在開作落花生期間，甘蔗受到遮蔭影響，分蘗較少，大培土不妨稍遲，落花生收穫後也不宜立即培土。

一百二十日採收花生

落花生於播種後一百一十至一百二十日，或第

一次開花後八十至九十日，葉片普遍變黃，基部葉片脫落，植株拔起可見許多飽滿充實的莢果，莢殼內側已經着色，網膜顏色加深，殼壁漸薄而硬化時採收。

收穫應擇晴天，在鬆鬆土壤可用人工拔起植株，振落泥土，摘取莢果。雨後土壤板結，可用鋤頭掘起。為節省勞力，今後希望用機械收穫。

莢果在夏季晒五至七日，冬季七至十日，使種子含水量不超過百分之十為止，與秋植甘蔗間作的落花生，假如生長良好，每公頃乾莢果產量可達一千五百公斤以上。

如為留種用種子，經選種後充分晒乾，連莢果儲藏於密閉的容器內，置於清涼乾燥的地方，可確保發芽率。

收穫莢果後的落花生藤蔓，可作為家畜的青飼料，堆肥既肥材料，經一、二日晒乾可埋於蔗行的側，充作肥料。（劉步達）

註：①春植及宿根蔗園間作花生，本刊將另有專文刊出。春植及宿根蔗園間作大豆，亦將另刊專文。（請參看上期本刊）

△農業小知識▽

△一般人認為，落花生種子愈小，榨油率愈高。可是事實恰恰相反：種子飽滿，大小齊一的，榨油率才高。（林興）

注意水土保持，

防止土壤流失。

注意水土保持，

保護生命財物。

「徵求」各縣經銷商

有意者惠函索取有關資料

卓効

續効

速効

日東 Folidol 乳劑

日東 マラソン 乳劑50

日東 ピーエム 乳劑50

日東 Parathion 乳劑 47%

日東農藥有限公司

廠址：臺北縣新店鎮七張路
地址：北府建二字第 1329 號
營業處：臺北市迪化街一段七九號
TEL: 46735



農林廳登記農藥

「保證品質」

各地農會及名農藥商種子商均有售