

年生的柑園，應該砍伐部份柑樹，以放寬距離。我所以建議砍伐，而不採用移植法放寬距離，因為樹長大後移植困難，即使移植成活，在移植後最初幾年，也產量大減，而且樹既已長得枝葉交錯，地下的根群，伸展更遠，互相交錯盤纏，更甚於地上部的枝葉，所以挖掘時，不但損傷了掘起株的許多側根，而且把保留株的根群也切斷很多，影響以後的開花結實。

重剪會使樹勢衰弱

柑桔樹不可以重剪（重剪就是剪去很多枝葉），重剪常使樹勢衰弱。它的整枝方法，應採取放任式的自然圓頭形或圓錐形整枝，整枝的方法如下：二年生柑桔苗定植後，在春季發芽前在離地一尺五寸到二尺處剪定。於是從樹幹上發生多數新梢，留上面的新梢三、四枝，預備它們將來發育成主枝，其餘下面的新梢是不要的，但是不可以把它們齊基部剪光，而是每枝留三、四片葉片摘心，這種枝梢，如果以後再發新梢，再留一、二片葉片摘心

，這樣反覆摘心，枝梢自然不會變成粗壯，等到上部枝葉已多時，才可以把它們全部齊基部剪去。至於樹幹上方所保留的三、四個主枝，必需使它們維持均等的發育，而且各與主幹成相同的角度，太長的主枝，應該摘心，使它縮短。夏梢發生時，再留三、四枝，這時應該選生在原來主枝兩側的枝梢。生在它的上下方的枝梢，必需除去。以後都是這樣保留主枝，到了第三年底就有足數的主枝形成良好的樹冠。

前面說過，樹幹上的側枝最後必需剪去，但主枝上的側枝，如果分佈不太密應該儘量保留，使它們結果。

注意用藥用肥安全

某些農友利用柑園空地養雞，許多用在柑桔上的農藥，對雞都有毒，像「地特靈」、「巴拉松」等。又如「馬拉松」的稀釋液，雖噴在雞身上不會中毒，但如流入飲水或飼料中，雞吃後也會中毒。對雞無害的柑桔用農藥，有「夏油乳劑」、「

石灰硫黃合劑」、「波爾多液」、「魚藤精」、「大生」等。

柑桔樹也可以葉面施肥，尿素濃度以百分之六為宜。但是本省產的尿素，含「二縮尿」達一%以上，噴後常引起肥害，葉片上發生黃斑，所以本省產尿素最好施入土中。

△奇菌靈的新用途▽

「奇菌靈」(Gibberellin)原來是一種非抗生性的植物生長促進劑，但據本年七月十日出版的美國科學消息小冊(Science News Letter)所載，它尚有促進動物生長的功效。據說，家禽餵食千萬分之一到百萬分之一極少量「奇菌靈」，可以顯著地增加生長速度，對牛、羊、豬等也很有效。

「奇菌靈」有許多種類，其中以A-1 A-2與A-3最為有效，比目前所用的盤尼西林與Silibestrol效果更好。此項專利權，已售與紐約蔡司飛厚公司(Chas. Pfizer and Co., Inc. of New York)。(周綉保)

世問良藥病癆肺

散肺療



主治 肺癆、吐血、止咳、痰黑、清肺、化痰、補虛、癆、肺的各種病症等。

內政部許可註冊衛成字第六七一號

香港脚專門治療藥出現

靈濕脚



主治 氣病、濕氣、脚、年久、不計

止即後用擦

癢癬病為脚濕氣病、專門治療藥

內政部許可註冊衛成字第三七三號

各地藥房均售

各地郵購均可向郵局劃撥儲金二二一五號


說明書函索即寄

臺北市重慶北路三段二四二號

景新製藥所出品

(四八)北市衛四廣檢字
第四〇五九號

司公限有份股廠工化豐民



安特靈
劑乳濃
Endrin 19½%

地特靈
劑乳濃
Dieldrin 18½%

阿特靈
劑乳濃
Aldrin 25%

現貨供應

址地

七五九二四、話電 號九几二路西寧長市北台
號七三一 路義信 中 義 嘉