

年生的柑園，應該砍伐部份柑樹，以放寬距離。我所以建議砍伐，而不採用移植法放寬距離，因為樹長大後移植困難，即使移植成活，在移植後最初幾年，也產量大減，而且樹既已長得枝葉交錯，地下的根群，伸展更遠，互相交錯盤纏，更甚於地上部的枝葉，所以挖掘時，不但損傷了掘起株的許多側根，而且把保留株的根群也切斷很多，影響以後的開花結實。

**重剪會使樹勢衰弱**

柑桔樹不可以重剪（重剪就是剪去很多枝葉），重剪常使樹勢衰弱。它的整枝方法，應採取放任式的自然圓頭形或圓錐形整枝，整枝的方法如下：二年生柑桔苗定植後，在春季發芽前在離地一尺五寸到二尺處剪定。於是從樹幹上發生多數新梢，留上面的新梢三、四枝，預備它們將來發育成主枝，其餘下面的新梢是不要的，但是不可以把它們齊基部剪光，而是每枝留三、四片葉片摘心，這種枝梢，如果以後再發新梢，再留一、二片葉片摘心

，這樣反覆摘心，枝梢自然不會變成粗壯，等到上部枝葉已多時，才可以把它們全部齊基部剪去。至於樹幹上方所保留的三、四個主枝，必需使它們維持均等的發育，而且各與主幹成相同的角度，太長的主枝，應該摘心，使它縮短。夏梢發生時，再留三、四枝，這時應該選生在原來主枝兩側的枝梢。生在它的上下方的枝梢，必需除去。以後都是這樣保留主枝，到了第三年底就有足數的主枝形成良好的樹冠。

前面說過，樹幹上的側枝最後必需剪去，但主枝上的側枝，如果分佈不太密應該儘量保留，使它們結果。

**注意用藥用肥安全**

某些農友利用柑園空地養雞，許多用在柑桔上的農藥，對雞都有毒，像「地特靈」、「巴拉松」等。又如「馬拉松」的稀釋液，雖噴在雞身上不會中毒，但如流入飲水或飼料中，雞吃後也會中毒。對雞無害的柑桔用農藥，有「夏油乳劑」、「

石灰硫黃合劑」、「波爾多液」、「魚藤精」、「大生」等。

柑桔樹也可以葉面施肥，尿素濃度以百分之六為宜。但是本省產的尿素，含「二縮尿」達一%以上，噴後常引起肥害，葉片上發生黃斑，所以本省產尿素最好施入土中。

**△奇菌靈的新用途▽**

「奇菌靈」(Gibberellin)原來是一種非抗生性的植物生長促進劑，但據本年七月十日出版的美國科學消息小冊(Science News Letter)所載，它尚有促進動物生長的功效。據說，家禽餵食千萬分之一到百萬分之一極少量「奇菌靈」，可以顯著地增加生長速度，對牛、羊、豬等也很有效。

「奇菌靈」有許多種類，其中以A-1 A-2與A-3最為有效，比目前所用的盤尼西林與Siltbestrol效果更好。此項專利權，已售與紐約蔡司飛厚公司(Chas. Pfizer and Co., Inc. of New York)。(周耦保)

**世問良藥病癆肺**

**散肺療**



主治 肺癆、吐血、止咳、痰黑、清肺、化痰、補虛、癆、肺的各種病症等。

內政部許可註冊衛成字第六七一號

**香港脚專門治療藥出現**

**靈濕脚**



主治 氣病、濕氣、脚、年久、不計

止即後用擦

癩癧病為脚濕氣病、專門治療藥

內政部許可註冊衛成字第三七三號

各地藥房均售

各地郵購均可向郵局劃撥儲金二二一五號


說明書函索即寄

臺北市重慶北路三段二四二號

景新製藥所出品

(四八)北市衛四廣檢字  
第四〇五九號

**司公限有份股廠工化豐民**



**靈特安**  
劑乳濃  
Endrin 19½%

**靈特地**  
劑乳濃  
Dieldrin 18½%

**靈特阿**  
劑乳濃  
Aldrin 25%

現貨供應

址地

七五九二四、話電 號九几二路西寧長市北台  
號七三一 路義信 中 義 嘉