

識知友叢

矮生菜豆的留種

矮生菜豆新品種「臺北二號」的播種適期，一年有兩季：春季（北部三月）及秋季（北部九月，南部九月至十月）。春季採收的種子，可以在同年秋季播種。秋季採收的種子，可以留到翌年春季播種。

矮生菜豆留種栽培時，最好在開花至成熟期之間天氣乾燥，雨量少。所以，以南部秋季最適宜作採種栽培。（王進生）

甜瓜與芥菜栽培

栽培甜瓜（メロン）最需注意選取純良可靠的種子，採用不純的種子，栽培必定失敗。

日照充足，通風良好的地方最適合栽培甜瓜。砂土、砂質土、壤土均可。最好集中大面積栽培，以減少蟲害。

種子先行催芽，每種穴播四粒，以免缺株補播影響生育。植距用畦調二百五十公分，株間一百公分，作高畦栽培。

基肥多施堆肥。追肥可用化學肥料，每十天施一次。

幼苗四葉時行間拔，每種穴留一株良苗，並行摘心，促進側芽發育，使提早結果。畦面應多鋪草，降雨時注意田間排水。

生育途中土壤宜保持適當水分（忌乾燥又忌過濕），並常噴藥防治病蟲害。

結果後如有強烈日光，或連日降雨時，應用紙袋套蓋果實，防止日曬或裂果。果實必須在充分成熟時採收，以提高品質。

本省的芥菜品種有「包心芥菜」、「扁甲芥菜」、「竹甲芥菜」及「大心芥菜」等數種。其中種子收量多，且較容易採種者為「竹甲芥菜」。壤土及砂質壤土最適於芥菜的採種栽培。農曆九月至十月播種最理想。每小斗種子約可售三百元左右。


每公頃三要素施用量：氮肥一百五十公斤，磷肥一百三十公斤，鉀肥一百二十公斤左右最理想。每公頃播種量約六小升，採種量約十至十五小升。（陳文郁）

應用二，四—D新法

二，四—D是常用的一種殺草劑，它可以殺死大部份的闊葉雜草，可是在果園內或果園附近應用時，常因藥劑（或藥粉）漂飛而損傷果樹；因為二，四—D對果樹也會發生毒害的。以出產柑桔出名的美國加里福尼亞州，還因此訂定法律禁止使用二，四—D殺草。

美國齊勃曼化學公司，最近發明一種使用二，四—D殺草的安全方法：將二，四—D與臘混合，製成二英尺長的方棒（右圖），將這方棒在地上拖過，便可以把二，四—D與臘均勻地塗在地上，殺死雜草。這樣，不但可以避免影響附近的果園，而且還因為有臘的保護，二，四—D可以長期殘留地面，繼續發生殺草的效果。

使用新式二，四—D殺草



據公司方面的報告，一條藥棒，可處理二萬平方英尺的面積，用法簡便，六歲的小孩已能使用。

捕捉烏龜妙法

烏龜是魚池內的一種「害蟲」，有時也爬進田內為害作物。下面告訴你一種捕捉的妙法：將一隻木桶（或木箱）放進池內，桶口高出水面六英寸，

奇效

經農林廳送交台灣省畜產試驗所試驗結果證明

一次見效 效果100% 絕無副作用

比配拉淨製劑猪驅虫新藥

狗仔面蟲藥



用法簡便且價錢又便宜

每隻小豬藥費僅需二至三元

小豬，體重每公斤用0.5瓦中，大豬用0.34瓦，以混合飼料中做一食，不需再給任何瀉劑，三至六天中，可以繼續解出，能使豬隻快肥又快大。


農會、藥房、飼料店均售

總經銷：德生西藥房 地址：台北市 民權路133號

包裝	定價
20公分	1000
100	45.00
450	180.00

郵購：劃掛單字30014

徵求經銷處



經過服用此藥後！

未服用此藥前

情形完全不同！