者的價格僅相差二、三角，那麼還是購舊簽比較合算。（李登元）

牧草可繼續放牧多年
攀葛草適宜本省種植

【問】：①「山珠兒豆」和「銀合歡」若作爲牧草種植，播種一次能繼續放牧割多少時間（年）？②各種牧草佈置一次能連續放牧和割多少時間（年）？在其間應否施肥？③牧草以那一種最好？何處有購？其價若干？栽培法如何？（高雄旗山文秀成）

【答】：①「山珠兒豆」與「銀合歡」均爲多年生牧草，若管理良好，能繼續放牧十年以上。②各種牧草視其生長習性，其連續放牧時間各有不同，多年生者長，一年生者以一年爲限（事實上僅數個月）。牧草與其他作物一樣，需要施肥。③經試驗結果及一般經驗，牧草以禾本科多年生者爲主，本省最適應者爲攀葛草，草苗可向鳳山高雄區農林改良場畜牧課索取。攀葛草種植方法，請參閱豐年十卷六期。（陸增輝）

乳羊分娩前不宜擠乳
母羊人工授精可學習

【問】：鄙人飼乳羊幾隻，其中一隻乳羊現在才十個月，已經受胎六十三天。我把牠擠出羊乳約半合左右，請問尚未分娩就有羊乳之分泌，是否奇蹟？可否繼續擠取？又我有一本「乳用山羊的飼養方法」的書，可是對於子宮的形成沒有附案，敬請惠賜一張略圖及人工受精的位置及尿道收縮口及子宮收縮口的位置。（臺中市祖文河）

【答】：乳羊於分娩前可能擠出乳汁少許但以不擠爲佳，因爲多擠將會影響胎兒之發育。關於乳羊之人工授精，台端如有興趣，可到臺南新化臺灣省畜產試驗所「家畜人工授精中心」見習。（余如桐）

擠羊乳必須注意消毒
小羊不健應補充乳量

【問】：①我們有一隻乳羊（柴能種）體很壯大，自從患了乳房炎之後吃了百多粒消炎片，請獸醫治療雖然好了，但產乳量已少到一、二瓶了。最近生了一隻小公羊，因乳少小羊也很不健康，近來母羊又加了氣喘，醫生也沒法子，不知是什麼緣故？是否會傳染他羊？

②有一隻母羊生了兩隻小羊，在山上生的，可是兩隻小羊都不會站立，半天後便死了，這是什麼原因？母羊現仍產乳。

③就職時重慶出版的一本養羊法（商務版）是許心芸編的，內有牛羊乳比較表：

	蛋白	脂肪	糖分	灰分	水
羊乳	四·六七	七·四一	五·六八	一·〇三	八二·〇三
牛乳	三·九〇	三·八〇	四·九〇	〇·七〇	八七·五〇

但不知該項成分是否正確？

④我們現在用的精料是豆腐渣麩皮等，但豆渣內要加水飼料很稀，否則若按照農復會「怎樣養乳羊」之飼料配法，羊乳加熱以消毒時，便凝固成豆腦狀，便不能吃了。

⑤如何使乳量增加？我們的羊有八隻產乳但平均不到四瓶（半磅瓶），總還的很好，每天上山吃草兩次精料。（彰化市劉志清）

【答】：①母羊於患乳房炎後，抵抗力減低，體質衰弱產乳減低頗爲自然，因而導致併發症，請將其送至彰化縣政府畜產課之家畜疾病診斷所，作確切的診治。

②不健康之小羊乃因吮乳不夠所致，應補充以其他母羊乳或牛乳乳製品等。小羊生出不能站立死亡，可能因（A）母羊營養不良或有病，（B）有遺傳性致死因子。

③羊奶蛋白質含量約爲三·〇—五·〇%脂肪含量約爲三·〇—五·〇%，該書所載略高，但產奶量少之羊其乳中蛋白質脂肪含量亦較少。

④羊乳於擠時，擠奶人之手，所用之盛器及羊乳頭等均應清潔消毒，否則細菌易於滋生而致酸化，乃結成塊。新鮮清潔之乳於加熱消毒時不會結塊。

⑤如羊之品種不良，則即使餵以好料亦不會增加產乳量，應予淘汰更新之。（方清卿）

消滅地下害蟲之特效藥

三共 SANKYO

三共ヘプタ　粉劑　乳劑

成分：Heptachlor（三共赫必速）

粉劑：成分 2.5%　包裝 3 公斤　紙包，箱 8 包

乳劑：成分 20%　包裝 300cc　瓶裝，箱30瓶

◎適合防治旱地作物之地下部害蟲：

甘藷象鼻蟲，甘藷猿葉蟲，金針蟲，切根蟲，蔬菜象鼻蟲，大豆根潛蠅，夜盜蟲，根蛀蟲，螻蛄，蟋蟀，雞母蟲，螞蟻，瓜蠅，玉蔥蠅，黃條葉蚤，葱薊馬等

◎價格廉宜，用法簡便，效力持久，人畜安全

◎詳細說明書函索即寄

出進口商　泰洋股份有限公司

臺北市重慶北路二段108號

電　話：44994號

強健又多產

臺南種鷄園的初生雛


夏雛打折優待

享克來來漢交種等
享克來來蓮紐維
享克來來拉花代
沙布系系遠紐維
省林農
省林農
國本本
他日日

全年孵化　訂購請早

（夏季無停）

說明書寄函索即



臺灣省農會指定種鷄場

兼營各種養鷄器材

臺南種鷄園

園址：臺南市東區衛國街五號　電話：4501號

郵政儲帳號南 30222 號

分場：臺南市東區裕農路後甲

請全省獸醫師養豬養鷄業者注意！

豬、鷄蟲藥之王—阿司卡利肯 Askariken（アスカリケン）（粉劑）

（內藥證字第一四六四號）

「適應症」豬，鷄之蛔蟲症、結節蟲症、鞭蟲症

公認最有效安全

①效力強大—殺蟲之力量百分之九十五以上。比任何種驅蟲藥超高。成蟲、蟲卵均死滅。

②用法簡單—投藥前不須絕食，服後不須使用瀉劑作用。

③價格最廉—豬一頭一元，成鷄一隻僅五分代價可獲得數百倍利益。

注意：「使用「阿司卡利肯」添加飼料投與時，飼料須要乾或濕的程度，切勿放入水飼料理」（會嘔吐）

日本東芝製藥株式會社榮譽出品

臺灣總代理　臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司

臺北市信義路二段一二〇號