



# 怎樣栽培球莖甘藍

## 才能賣得好價錢？

栽培球莖甘藍，最好能在十一月以前收穫。這時，蘿蔔還沒上市，各種莖菜類也很少，一定可以賣得好價錢。

本省的球莖甘藍（大頭菜，菜鴿），多在十二月以後才收穫，正值蘿蔔盛產的時候，常常賣不到好價錢。因此，栽培球莖甘藍，愈早愈有利，最好在十一月以前收穫。這時，蘿蔔還沒上市，各種莖菜類也很少，一定可以賣得好價錢。但是要在十一月以前生產球莖甘藍，必需提早，在八、九月間播種。八、九月間氣候炎熱，暴風雨多，土壤乾旱，所以在技術上應注意下列事項，才能栽培成功。

### 「金門早生」品種較好

目前臺灣栽培的球莖甘藍品種很雜。外國引進來的「維也納白早生」(Early White Vienna) 品種植株性狀優良，不易抽苔。「本地種」抗熱性強，可惜個體大小不均勻。「金門早生」品種，球莖形狀整齊。

這三種品種都可以採用，尤其「金門早生」球莖甘藍，對本地適應力強，夏季栽培很有利。

### 遮蔭培育良苗

球莖甘藍的平地一般播種期，在北部為十月至翌年二月，中南部為十月至翌年一月。但是要供應早期市場，應在八月中旬至九月上旬播種，因此，育苗應有遮蔭設施，或於高冷地育苗，否則幼苗必因高溫乾旱，影響生育。

苗床以南北向為宜，並應作一公尺高的架，上覆竹簾或草簾，防止強烈陽光直射。至於東西向，清早及黃昏，較微弱的直射光線可

自畦的橫面射入，不至於因光線不足而影響發育。苗床選擇粘質壤土，或多施堆肥等有機肥料，以增加其保水力。

因為夏季土壤受陽光照射後，溫度增高，容易乾燥，施用有機肥料，可改善土壤的保水力，並減低土壤溫度。

種子應稀播，假如播種過密，應行間拔。因為幼苗不經過假植，生長迅速，過密時會使植株纖細，易得立枯病，無法獲得健全的幼苗。

### 灌溉水滲入尿素肥

灌溉應在早晚土壤溫度低時舉行，否則根毛表皮易被燙傷死亡。

灌溉時，水份應盡量供給，並宜每日灌水二次。每隔三至四日，灌水時宜滲用〇·五%的尿素肥料，以增加肥份。

颱風來襲時應注意排水，暴風雨後應注意扶正植株。

### 多施有機質基肥

球莖甘藍施肥，應着重於基肥，有機質肥料，更不能缺少。所以，在定植之前，應多施堆肥做為基肥。

至於追肥，可比照普通栽培法，分三、四次施用。磷肥及鉀肥的補充，更不能忽略，否則球莖發育不良。

### 本葉四、五枚時定植

菜苗在本葉四、五枚時定植於本圃。定植時應

注意下列幾點：

①在定植前三天，苗床停止灌水，如此在掘取苗株時較容易操作，且因苗株含水量較少，定植時容易成活。

②定植適期為本葉四至五枚時，不可過大，否則不易成活。

③如為高冷地育苗，必需待朝露乾後才掘苗，並置冷涼的地方，使苗株冷後裝運平地，最好當日定植。

④株距可減少為四十至四十五公分。

⑤定植後應充分灌水，假如天氣乾旱，地面最好覆草。

⑥徒長苗株及纖弱株，應予剔除。

### 定期噴藥防治病蟲

天氣酷熱及乾旱時，病蟲害容易發生。對夜盜蟲、擬尺蠖、菜心螟、黃條葉蚤、與蚜蟲等害蟲，每隔五至七日噴佈「馬拉松」或「安特靈」六百至一千倍稀釋液防治。

至於病害方面，可每隔七至十日噴射「大生」五百倍液一次，以防治腐敗病與炭疽病發生。

### 四十至五十日採收

球莖甘藍的收穫，不宜太早，也不宜太遲；太早風味不佳，過遲肉質變硬，不適合食用。

適當


的收穫期為定植後四十至五十日左右

，球莖發育豐滿即可順次收穫，但是

可依市場價格高低，稍為提早或延遲

。

(林進)



苗床最好向北向南，並應有遮蔭。