

注意蔓延中的 水稻黃萎病

簡錦忠

稻黃萎病最初發現於民國十二、三年，但是一直沒有受到一般人的注意。近年來，在本省各地，本病有逐漸擴大蔓延的趨勢，希望農友們多加注意，以減輕損害。

二期作發生較多

稻黃萎病在本省第二期稻作比第一期作發生較多，假如早期發生，會使全株受害，於抽穗前枯死；即使能抽穗，也多不結實。

受害稻株的葉中肋兩側變黃，並漸次擴大範圍，然後，由葉尖或葉邊緣開始萎縮而枯死。

又受害稻株的分蘗多，植株矮小，葉身與葉鞘都帶黃色，新葉短小，有時較寬。

植株萎縮變黃

稻稈的基部，大部份被葉鞘包圍，看起來很肥大。地上部的節上，常生鬚根。根部發育不良，容易拔取。

患病較嚴重時，地上部全變黃色，由下葉漸次枯萎，但能繼續分蘗。

浮塵子媒介而蔓延。稻苗秧田日數過長或天旱不雨時，本病發生較多。

預防方法二種

到目前為止，對稻黃萎病還沒有直接有效的防治方法，只能注意下列的兩點，防備蔓延。



(1) 驅除浮塵子：稻黃萎病的病原，是一種毒素。由浮塵子媒介傳染。所以要預防本病，首先應驅除浮塵子。

驅除浮塵子的方法：每公頃撒佈一〇% DDT 粉劑，秧田期四十公斤，本田期四十至五十公斤，蟲害盛發期每隔七至十天施藥一次。田間畦畔及附近的雜草地也應同時撒佈藥劑。

(2) 除去田間雜草：稻谷收穫後，浮塵子都飛往稻田附近的雜草叢中潛伏，所以應清除田間的雜草，驅除越冬的浮塵子。



。取拔易容根，良不育發部根，株稻的害為病萎黃受

<p>「沙發美星」</p> <p>注射液 33½%</p> <p>'SULPHAMEZATHINE' 33½%</p>	 <p>英國卜內門公司 各種獸醫藥品</p>	
		
<ul style="list-style-type: none"> • 功效可靠 • 使用簡便 • 一經採用 • 保證滿意 	<p>專治</p> <p>禽畜之腸炎 肺炎，球蟲病 及各種 細菌性疾病</p>	
<p>現貨總經銷</p> <p>永生西藥行</p> <p>台北市中山北路一段一二四號 電話：四二四七六</p>		

大生二十二 (DITHANE M-22) 可濕性粉劑防治各種病害，亦能防治紅蜘蛛成蟲及幼蟲，且有錳素促進生長，增加產量。對下列作物及病害有特效。


西瓜，胡瓜	蔓枯病
番茄	晚疫病
馬鈴薯	早疫病，晚疫病
甜菜	葉斑病
落花生	葉斑病
芹菜	葉斑病

* * * * *

大生七十八 (DITHANE Z-78)

可利生 (KARATHANE 5WD)

開路生 (KELTHANE W)



大生二十二可濕性粉劑三磅美國原裝

臺灣總代理 **青象貿易有限公司**
 臺北市中正路1756號三樓 電話：27467
 郵政劃儲臺灣第2156號
 函索農藥說明書附郵票四角即寄