

識知友羣

鷄舍涼爽產卵多

美國加尼福尼亞大學的家禽專家，認為在夏天可以用下列的幾種方法，使產卵鷄感到涼爽，提高產卵率：

一、天氣炎熱時，鷄舍水槽內的飲水要添深些，使鷄隻頭部的垂肉常常能沾濕而感到涼快。

二、在熱浪侵襲的期中，要連續餵飼幾天抗生素飼料或補充飼料，如濕的米糠或奶粉等，使卵鷄的食慾增加，下蛋率不致受到影響。

三、房舍之間的空地上要種植草類，谷類或豆科植物，這樣可以降低地溫，也可以減少地面上的反射熱。

四、利用噴霧器將水霧噴到卵鷄身上去，以降低其體溫。

五、用板條做鷄舍房頂比較通風涼爽。

六、鷄舍的屋頂如果是用鋁板做的，要常常保持潔淨和光亮，這樣可以加強太陽熱的反射，減低鷄舍裏的溫度。

七、氣溫高的時候，儘量避免鷄羣的走動，以免增加鷄的體溫。(大宇)

玉米種粒的形狀

對產量並無影響

美國農民買雜交種玉米種子時，喜歡選購種粒扁平的。可是通常整條的穗上，只有中段三分之一部份，長着扁平的玉米粒，而兩端剩餘的三分之一部份，都是大圓粒和小圓粒，不受農民歡迎，這種情形使種子商很傷腦筋。

種子商為了適合顧客的心理，把玉米穗的兩頭切下，並將這部份的圓粒種子，以較便宜的價錢賣出。其實，農民們大可以買下這些便宜的玉米做種子，而不必擔心到產量的降低。如果買小圓粒的做種，就更合算。因為種粒愈小，每一斗種子的粒數愈多，可以播種的面積愈大。而在長成玉米以後，據說扁粒種與圓粒種毫無區別，也不會影響到單位

產量。美國的老農們，一向認為玉米穗兩端的圓粒不適合做種的觀念，可能是沒有根據的。(大宇)


預防母猪壓死小猪

中美農友各有千秋

本省農友預防母猪壓死初生仔豬的方法，是在豬舍牆上，用圓木或竹子架設「分娩架」。現在，我們且看美國農友怎樣設計豬的產房。

左上面圖所示，是一種裝有斜板的產房，仔豬生出後，一隻隻自動滑入斜板下面的木箱，木箱內鋪着稻草，並有取燉用的電燈。

下面是一種十二角型的產房，母猪靠着牆躺臥，仔豬睡在暖和的內側，圓形的鐵欄杆，供保護小猪之用，據說仔豬的死亡率只有百分之二。(銘唐)



利用無線電波

可以開關抽水機

美國阿利桑那大學，已經從若干試驗中知道，在不久的將來，農民可以坐在家裏，利用無線電波距離控制的方法，使田間的抽水機自行發動或停止。用來控制抽水機開關的工具，是一個大約五磅重的輕便無線電發射機，它可以靠普通載貨汽車上所產生的電流來發動，也可以把它經常接在約一百一十個電壓的電線上，通過電流而發動。(林)

嘉義清河種子行 優良種子

各位親愛農友：你欲栽培蔬菜成功滿意收穫嗎？請向種子專家嘉義清河種子行採用優良種子，才能得到滿意成功的收益，清河種子行各項蔬菜種子，已陸續入荷齊備了一本本省產種子，日本種子，美國種子以及其它外國種子。在庫豐富供應各位農友們栽培將秋季冬季適用優良種子提供於下：

- 早生550 天純白結晶花椰菜 日本長岡交配一號甘藍菜
- 早生550 天純白結晶花椰菜 日本海谷九號三池中生甘藍菜
- 新品種 早生60天白結晶花椰菜 日本北金澤系結晶頭菜
- 新品種 中生早粉白結晶花椰菜 金門結晶頭菜
- 新品種 晚生白結晶花椰菜 美國新野川牛旁ゴボウ
- 中晚生白結晶花椰菜 美國派派洋葱(巴比路號)
- 清河交配新品種晚生雪白 日本長岡交配三號トマト
- 大花椰菜 日本長岡交配大型福壽トマト
- 早中生35天黑葉包心白菜 日本四葉胡瓜
- 正赤葉大包心芥菜 瓜(青皮白刺胡瓜)
- 早生40天長種馬耳松菜頭 瓜(金皮白刺胡瓜)
- 改良大梅頭花菜頭 油頭原種長種冬瓜(白菜頭)
- 阿日山頭花菜頭 梅花菜頭(南屏州梅花春)
- 日本東湖波蕪菜 美國加州大粒甜蕪菜
- 早生白骨片菜 日本ミンスターノ下波蕪菜
- 晚生白骨片菜 晚生高脚九子波蕪菜
- 清生白骨片菜 八月菜(黑鬼仔豆)
- 黃金白菜 豆仔莢
- 正入十天油菜 特大葉耳冬荷
- 蘇江白菜 日本丸葉山東白菜
- 蘇江種木瓜 正四川榨菜(現貨入荷)

清河種子行

嘉義市中正路四八二號
電話：三五八四號
臺灣割儲嘉字第八〇〇三七號