

秋冬季栽培有利的

結球芥菜

·王進生·

本省栽培的芥菜種類很多，結球芥菜為最有希望的一種。它的品質佳良，並且含有豐富的維他命，適於煮食及加工，需要量每年都在增加，各位如能按照下面的方法，在秋冬季栽培，利益一定很優厚。

適合早植與晚植

結球芥菜有濃綠及淡綠兩系統，前者比較耐熱，八月中旬就可開始播種。水田裏作時，兩系統都可採用。

濃綠色品種的播種期為八月中旬至九月上旬。水田裏作的播種期為十一月上旬至十二月上旬。

熱水消毒後播種

每十公畝地（一分地）所需株數約四千株，播種量約為十八公分（約半臺兩）。種子在各大種子行都有出售。

為預防黑斑病，種子應先消毒後播種。通常將種子浸漬清水六小時後，再浸於攝氏五十四度的熱水五分鐘，以殺死病菌。

播種法可用撒播或條播，不需假植。最好選紅土圃地作苗床。本葉展開前，應噴射「大生七十八」四百倍液，預防露菌病發生。

本葉四枚時移植

播種後二十一天，本葉約四枚時，就可定植於本圃。

為避免病害發生，本圃最好採用水田地。普通將水稻十二行耕起，構成一畦。畦高二十公分左右，畦面寬約一、八公尺。

每畦栽四行，行距約四十五公分，株距三十五公分或四十公分。每十公畝地施用堆肥一千公斤，過磷酸鈣三十五公斤，氯化鉀十五公斤作基肥。

基肥採用穴施肥；即按株距掘穴後施下基肥，再用土覆蓋混合，然後定植菜苗。定植後，畦面最好用稻草覆蓋，以免下雨時泥

土附着葉背，並防止雜草生長。

追肥應及早施用

定植後一星期或十天以內，就應開始施用追肥。第一次施用腐熟人糞尿，每十公畝用量約一千公斤。第二次於第一次追肥後半個月施下，用量：

硫酸鉀十二公斤，氯化鉀三公斤，或尿素六公斤，氯化鉀三公斤左右。



注意八種病蟲害

結球芥菜的主要病害計有黑斑病、露菌病、腐敗病，與毒素病等。種子消毒，三年輪作一次，定植後繼續噴射「大生七十八」四百倍液三、四次，澈底驅除蚜蟲及黃條蠶蟲，都是有效的防治方法。

主要害蟲有：食心蟲、蚜蟲、青蟲，與黃條蠶蟲等，可噴射DDT乳劑五百倍液，及「馬拉松」一千二百倍液驅除。

每球重約二臺斤

八、九月間栽培的，在定植後五十天左右就可開始收穫。十一、二月間栽培的（裏作栽培），大部分都用於加工，應留到六十天左右，球部較大時才採收。前者每球重約一臺斤，後者約二臺斤。