

## 兩種合適秋播的

## 花椰菜新品種

—— 郁文陳 ——



月九合適間播種的新花椰菜



月十合適間播種的新花椰菜

## 十月間播種的品種

## 充分施肥充分灌水

通稱「鳳山晚中生」。株形稍與臺南的一樣，但比「喜樹中晚生」矮小，抽苔採收較快，品質也較好。本省各地在十月上旬播種成績最好，但是在九月中旬至十月下旬間都可播種。

肥。每十公畝地，「中早生」種用硫酸鉀七十公斤，過磷酸鈣三十五公斤，氯化鉀十五公斤，混合分五次施用。「中晚生」用硫酸鉀九十公斤，過磷酸鈣三十五公斤，氯化鉀二十公斤，混合分六次施用。追肥後應行除草培土，乾燥時充分灌水。

花球抽出後，應行花球的軟白，以提高品質。新品種的病害較少，但是蟲害仍須要注意防除。

## 整潔花球售價較高

「鳳山中早生」在定植後約六十五天採收，在定植後約八十五天採收。採收宜在清晨或傍晚，每日或每二日採收一次。採收的花球，應留七至八片葉柄。採收搬運中也應保持花球的整潔。

這兩種花椰菜的吸肥力很強，定植後應充分施肥。每十公畝地，「中早生」種用硫酸鉀七十公斤，過磷酸鈣三十五公斤，氯化鉀二十公斤，混合分六次施用。

這兩種花椰菜都應選土層深厚，排水良好的土地定植。土地應充分深耕，基肥每十公畝地施用堆肥二千公斤，過磷酸鈣八十公斤，氯化鉀三十公斤，用條施法施入。本圃也需採用高畦。「鳳山中早生」畦寬（連溝）一·五公尺，每畦栽二行，行距七十五公分，株距五十公分，每十公畝地可密植二千五百株左右。「鳳山中晚生」畦寬（連溝）一·七公尺，每畦栽二行，行距八十五公分，株距六十公分。苗株盡量選育良好的，並應帶土定植。定植後應充分灌水。



倒放田間時間藏



掛陰處涼在噴水處時

利用第二期水田裏作最為理想。定植至採收約六十五天，花球白美整齊，而且很緊厚；一球平均重量約一·二公斤。因為花球大而花莖細小，所以食用部份較多，品質很好。且因植株及花球發育快速，又耐病害，栽培很少失敗。

通稱「鳳山中早生」，植株比一般中生品種為小，株形不開展，葉色濃綠，葉面皚粉多，葉片狹長。本省各地在九月上旬播種品質最好，產量最高，但是在南部九月下旬仍可播種。南部約一·二公斤。因為花球大而花莖細小，所以食用部分較多，品質很好。且因植株及花球發育快速，又耐病害，栽培很少失敗。

## 九月間播種的品種

下面介紹鳳山熱帶園藝試驗所近年來育成推廣，適合九、十月間播種的二種優良花椰菜新品種，給農友們作參考：

## 苗床本圃都用高畦

育苗時，選擇排水良好的土地，充分施熟堆肥，做高畦苗床。栽培十公畝地（一分地）所需種子約二十公分，用撒播或條播，苗株間距應在六公分左右。

育苗期間如有蟲害，可用BHC或DDT防治。追肥用二百倍的硫酸鉀液，但是幼苗發育良好的，不需要追肥。

這兩種花椰菜都應選土層深厚，排水良好的土地定植。土地應充分深耕，基肥每十公畝地施用堆肥二千公斤，過磷酸鈣八十公斤，氯化鉀三十公斤，用條施法施入。本圃也需採用高畦。「鳳山中早生」畦寬（連溝）一·五公尺，每畦栽二行，行距七十五公分，株距五十公分，每十公畝地可密植二千五百株左右。「鳳山中晚生」畦寬（連溝）一·七公尺，每畦栽二行，行距八十五公分，株距六十公分。苗株盡量選育良好的，並應帶土定植。定植後應充分灌水。