

# 農復會雜果種植計畫請

## 報填作合們農植會改進

中國農村復興聯合委員會植物生產組正在調查本省各縣市雜果類（包括番石榴、蓮霧、木瓜）生產狀況，以便研究改進生產計劃。各農友中如有種植番石榴、蓮霧、木瓜等，而單一果園面積達〇·五公頃以上者（雖總面積〇·五公頃以上，但分散零星者不算），請依左列項目，詳實填妥後寄臺北市南海路廿五號農復會植物生產組收。該組將依實際情形，考慮辦理改良示範工作。

### 填報項目

#### 一、果樹種類：

#### 二、單一果園面積：

#### 三、樹齡：

#### 四、年產量：

#### 五、果園位置：

縣（市）鄉（鎮里）鄰

公頃  
年生  
公斤

#### 六、交通狀況（如何通往臺灣鐵路縱貫線及主要省縣公路）

#### 七、附近栽培同一種果樹之種類及面積：

#### 八、目前急待改進事項：（下列各點中認為最重要者劃一∨記號）


- ①防治病蟲害
- ②施用肥料
- ③指導修剪
- ④其他

#### 九、果農姓名：

#### 十、果農通訊地址：

縣（市）鄉（鎮）  
鄉（里）鄰號

榴石番·霧蓮·瓜木·



外銷有希望的系統大葱品種

# 怎樣種得好大葱

## 王進生

大葱可以生吃，也可以煮食，內銷外銷都很有利。下面告訴你怎樣種得好大葱的方法。

### 內外銷三個品種

#### 大小苗分開定植

本省栽培的大葱品種，可分為濃綠系統（クロガラ），淡綠系統（アカガラ），及中間系統（アヒガラ）三種。濃綠系統耐熱，分蘖少，適於本省四至五月播種，九至十月中旬定植。中間系統也耐熱，但是分蘖稍多，適於九至十月播種，十二月定植。淡綠系統耐熱性弱，分蘖最多，適於高冷地四至五月播種，八至九月定植。

大葱應選排水良好的肥沃土壤，或坡度較緩排水良好的粘質壤土栽培。土壤酸礦度最好在五七至七二之間。最近軟腐病發生較嚴重，所以應選前作物未會發生軟腐病的土地為圃地。蘿蔔、甘藍及結球白菜都容易發生軟腐病，不要與這些作物連作。

本園不須犁耕碎土，按所定的行距（〇·八至〇·九公尺）用鏟子或鋤頭開掘寬十五公分，深十五至十八公分（大苗十八公分，中苗十五公分）的定植溝。為使陽光容易射入，溝的方向應採用東西

苗床應經常含有適量的水分，但應是排水要良好，且富於有機質，反應中性。

為使追肥及施肥方便起見，應採用條播，條寬十五至二十公分，每十公畝（一分地）本園所需苗床面積為三十平方公尺，播種量約為〇·八公升。

用鋤頭作六至八公分深的播種淺溝，施下腐熟堆肥一百五十公斤與磷或過磷酸鈣七公斤的混合物，覆土後將溝底勻平，然後下種。

為使苗株大小齊一，最好假植一次。假植床的面積，為苗床的二·五至三倍。假植時，應將葱苗分為大小二級，分開假植。

苗期的追肥，最好用腐熟人糞尿或尿素。第一次追肥，在苗高七至八公分時施用。第二次追肥，在苗高二至十五公分時施用。第三次追肥，在苗高二十至三十四公分時施用。

為使葱苗生育良好，應噴射「大驅除蚜馬及蚜蟲」於定植前二星期停止灌水，使苗硬化。