

藥農記登廳林農府政省灣臺



牌東大

1%	5%	10%	20%	50%	50%	47%
殺	水	靈	安	馬	P	已
鼠	銀	丹	特	拉	M	拉
劑	乳	乳	靈	松	乳	松
劑	劑	劑	劑	劑	劑	劑

售有均行藥農會農地各省全

廠工化東大

號七九段一路民三區西市中臺：址廠
號七七六四：話電

竭誠服務、敬祈惠顧

成份確實、效能可靠

高。夏播以六、七月間為宜，秋播以九月下旬至十月上旬為宜，生育日數約二〇—一三〇天。(劉文慶)

氫化鈣可作番茄基肥

茄田敷草可防止雜草等

【問】：一、我種番茄想用草木灰加鳥肥施在畦中央，是否會比堆肥成續好？二、在畦兩旁種番茄而且用稻草蓋起來，這樣是否可以？(彰化縣莊老福)

【答】：一、施堆肥加草木灰與土壤充分混合作基肥，很為理想，鳥肥(氫化鈣)亦可作番茄之基肥，但施用後十五天才能栽種番茄。

二、番茄田敷草，在夏季可防止雜草之繁茂，及因降雨時畦面土壤之流失，亦可保持土壤水分，和降低地溫幫助番茄的發育。(陳文郁)

幼嫩牧草可作雞飼料

禾本科藍草飼料較好

【問】：養雞飼用何種牧草？含蛋白質及各種養份多少？草種何處有售？請即告知。(臺南市全勝榮)

【答】：養雞牧草以苜蓿、車軸草等含蛋白質較多，營養較為豐富，其蛋白質含量在四—五%之間；但這些豆科牧草在本省生長欠佳。禾本科以藍草飼料較好，其蛋白質約含三%。總之凡是牧草幼嫩時為雞之青飼料，補充飼料或續均佳。關於牧草種子之供應，請函詢新化省畜產試驗所洽購。(李登元)

家禽疫苗啓封未用完

應放冰箱中或蔭涼處

【問】：(一)本人養有鷄母數隻，其中一隻二月中生蛋十個，三月初開始孵起後至三十日只出五隻，餘五個因不出即時移放微溫水裏，試看結果全然不動，後打破卵殼一

看鷄子皆已死，有的乾而不臭，有的殼內積水開始腐爛，請問致死的原因。(二)血清製造所出品之鷄痘、霍亂、新城雞痘等之預防疫苗及鷄痘治療藥，開封後可以使用多少時？(南投竹山陳平善)

【答】：一、你的鷄隻孵化率為百分之五十，成績不甚佳。你說不出的蛋，有的乾而不臭，這是鷄之胚胎已經發育相當完全後死去而不能孵出。積水腐臭有兩種可能的原因：一種是孵化蛋根本沒有受精，像這樣的卵孵三十天，當然破殼發臭了。另一種是有受精，但其胚胎發育至中途而死去，故有部份積水發臭的現象。受精卵孵化不出的原因，濕度(空氣水份)不足，溫度不夠(鷄母常離巢的關係)均有影響。二、家禽之疫苗啓封後如不能用完，應即放冰箱中，若無冰箱設備，亦應置於蔭涼之處，並避免光線之照射，保存的時間可以較久(可能如出品保藏有效期之說明)，不然，啓封後數日即不宜使用。(李登元)

種植果樹需要深厚土壤

優良梨種有「橫山中生梨」

【問】：我有山背梯田一分五厘，春夏水量特豐，而秋冬則缺。朝陽不易照射，土壤酸性多石，特請解答下列疑難：一、現已深掘排水溝，且播種蘿蔔，意欲經常種植旱作，是否可以？二、有人勸我種植李子樹或柑樹，但株數太少，而又需要嚴加照顧，故不能決定，祈見示。三、今年冬欲種植優良梨種，但又不悉應以何品種為宜。四、綜上所述，請問究以種植果樹為宜抑以種植雜糧為宜？(臺中縣張瑜亮)

【答】：一、大多數園藝作物都需要很多勞力去照顧，例如，病蟲害發生時須立即防治。二、種植果樹需要深厚土壤。一分五厘地約可種李子樹九十株，梨樹六十到七十五株。三、優良梨品種應於本省氣候者有「橫山中生梨」。四、若人工缺乏或土壤瘠薄而淺，不如種雜糧。(蔡致誠)

「沙發美星」

注射液 33 1/3%

'SULPHAMEZATHINE' 33 1/3%

專治禽畜之腸炎
肺炎，球蟲病及
各種細菌性疾病
• 功效可靠迅速
• 使用簡便安全

「芬樂維斯」

'PHENOVIS'

防治禽畜之蛔蟲
胃蟲盲腸蟲及各種
寄生蟲性腸胃炎
• 治療預防均有效

「美尼」

'MINEL'

防治牛羊之蛔蟲
及肝蛭蟲最有效



英國卜內門公司
各種獸醫藥品
• 一經採用
• 保證滿意
說明書備索

現貨總經銷

永生西藥行

台北市中山北路一段一二四號 電話：四二四七六