



蟲益夜果與(上)蠶地小
蟲幼及蟲成的(下)

場張松壽)
(臺南農改
深的土中。
埋入一公尺
株燻却，或
；拔除被害
防治法
播。業的人畜傳
及在園中作
、昆蟲，以
、昆蟲，以
本病由風雨、灌溉水
以後就不易發生。本病由風雨、灌溉水
在發芽後一個月較易發生露菌病，以後就不易發生。本病由風雨、灌溉水

至枯死，影響產量很大。

露菌病

玉米心葉的葉脈發生淡黃色的縱條斑紋，然後又變為褐色，上面有赤褐色的條紋，葉背有白粉狀的霉，植株矮化不抽穗，終

防治法：①切除被害葉燻却。
②肥料要充分施用，缺肥時最易發生本病。

本病在氣溫攝氏二十三度，濕度較小時開始發生，所以在氣溫適宜又逢降雨時發生最多，而高溫乾燥時發生很少。本病由被害葉上的分生孢子隨風傳播。

葉枯病

本年春作玉米葉枯病發生很嚴重，被害株葉面發生藍色的小斑點，然後漸次擴大為藍灰白色紡錘形，病斑大小有五十公分左右，邊緣黑褐色。

防治法：①整地前每分地用四〇%「阿特靈」可濕性粉劑一毫斤，加水一百台斤，用噴霧器噴於土面，並翻入土中後方行播種。

②發現作物地上部被切斷時，撒布一〇%DDT粉劑或一%BHC粉劑，每分地用三至四公升。

小地蠶不但切斷玉米株，同時也潛入心葉中食害。每年發生五至六次。

地下害蟲：地下害蟲有金針蟲、臺灣大蟋蟀，及小地蠶等。臺灣大蟋蟀每年發生一次，成蟲在本省南部五月，北部七月出現。

幼蟲在一個月後出現。

防治法：可於發生時應用DDT二五%五百倍液，每分地噴射一百至一百二十公升，但是發生在玉米螟施藥時期的不要另行施藥。

地下害蟲

地下害蟲有金針蟲、臺灣大蟋蟀，及小地蠶等。臺灣大蟋蟀每年發生一次，成蟲在本省南部五月，北部七月出現。

幼蟲在一個月後出現。

防治法：可於發生時應用DDT二五%五百倍液，每分地噴射一百至一百二十公升，但是發生在玉米螟施藥時期的不要另行施藥。

幼蟲在一個月後出現。

防治法：可於發生時應用DDT二五%五百倍液，每分地噴射一百至一百二十公升，但是發生在玉米螟施藥時期的不要另行施藥。

幼蟲在一個月後出現。

防治法：可於發生時應用DDT二五%五百倍液，每分地噴射一百至一百二十公升，但是發生在玉米螟施藥時期的不要另行施藥。

幼蟲在一個月後出現。

孕穗期與殺蟲劑混合使用噴射既可殺蟲，又可治白穗。

稻熱病特效藥!!

北興  **富米農** 片劑
(フミロン錠)

北興 水銀波爾多 水溶劑 (水銀ボルドーCP)

鹿兒島 嚇必達 粉劑 (ヘクタ粉劑)

製造廠：日本北興化學工業株式會社 地址：臺北市太原路20號

臺灣總代理：GV 大勝貿易有限公司

電話：45877號

- 各地區經銷處
- ①宜蘭市崇聖里康樂路116號
 - ②臺北縣三重鎮仁化街56號
 - ③新竹市東門市場內
 - ④桃園縣中壢鎮大同路44號
 - ⑤苗栗縣
 - ⑥臺中市興中街88號
 - ⑦臺中市復興路四段39號
 - ⑧南投縣草屯鎮中山街15號

電話 403
電話 1043
電話 202
電話 4384
電話 63
電話 135

新豐行
豐盛行
信豐行
國泰藥行
正豐藥行
隆泰藥行

- ⑨臺中市三民街一段175號
- ⑩雲林縣斗南鎮新興街30號
- ⑪嘉義縣竹塹六甲村199號
- ⑫臺南市公園路173號
- ⑬高雄縣大樹鄉牌脚村42號
- ⑭屏東縣萬丹鄉萬丹街69號
- ⑮屏東縣麟蹄鄉中山里永樂街25號
- ⑯花蓮縣

電話 3343 信全豐藥行
電話 17年 永豐藥行
電話 35 蓬萊藥行
電話 萬安藥行
電話 萬安藥行