

草牧的植種季冬部北宜適

冰魯甜·英雲紫·麥燕

燕麥

供飼料用的燕麥，以莖葉較多，抽穗開花較遲的品種為最適宜。燕麥可在若干地區利用耨仔栽培，有時成績很好，但是還在第二期水稻收割後，整地種下比較可靠。基肥每公頃用硫酸銨二百公斤，過磷酸鈣三百五十公斤，氯化鉀一百五十公斤。過份瘠薄的田地，最好另外再施堆肥一千至三千公斤。在發芽後二十天，再施追肥一次，每公頃用氮肥一担公斤。

在排水不良低窪的水田，燕麥需要作畦，播種量每公頃四十至六十公斤，條播或撒佈。條播時行距二十至三十公分，每隔二至三分放種子一粒，上面蓋土二至三分公，並加鎮壓。

在適宜的氣候下，燕麥大約在一個半到二個月後便可開始刈割。如希望多收刈幾次，便應提早刈割，並在刈後立即施肥。每公頃生草產量約為四萬至五萬公斤。

紫雲英

紫雲英除了作飼料外，還可做綠肥或當蔬菜食用。紫雲英最適於在濕潤的土壤上生長，通常在第二期蓬來稻收穫前十五天左右，播入水田；撒播或每隔一行水稻播種一行。每公頃用種子十五至二十公斤。

以前沒有種過紫雲英的田地，種子要先行根瘤菌接種。最普通的方法，是挖取種過紫雲英的田土，以一斤種子對

二十斤土壤的比例，拌和後播在田中。在播種前最好每公頃施下過磷酸鈣或熔磷二百至三百公斤，氯化鉀一百公斤作為基肥。假如土壤過份瘠薄並且是初次種植紫雲英時，可另加硫酸銨或氯化鈣五十至一百公斤。酸性過強的土地，最好每公頃施用石灰石粉二千至三千公斤。在生長期間如土壤過乾，最好能灌溉一、二次。生長良好時，下種後一百天左右，便可開始刈割。因為紫雲英所含營養份豐富，豬、雞、牛、羊全可餵飼，每公頃生草量通常有二萬五千公斤左右，在本省的記錄，最高產量曾達六萬九千公斤之多。家畜



麥燕—草牧季冬種一的培栽部北灣臺台適



西德新農藥

BASF 獅馬牌 巴地斯 化工廠



Badische Anilin & Soda Fabrik A.G.

寶力母 Z
(Polyram Z)
主要成分—Zineb

高效殺菌劑含鋅化學物 (Zineb) 65%
世界各地都用於防治柑桔番茄馬鈴薯西瓜等多種病害
用0.2% (200g/100L水)

寶力母 M
(Polyram M)
主要成分—Maneb

含錳化學物 (Maneb) 70%，世界各地均用於控制馬鈴薯番茄及各種蔬菜等的病害。

可撲死 (COBOX)
主要成分—Copper
Oxychloride

強力有效的殺菌劑含氧氯化銅 88%，世界各地用作撲殺果樹雜糧等的菌性病害。

枯末路 (Kumulus)
主要成分—硫磺


強力有效的可濕性硫磺粉劑，成分90%

BASF 展着劑
(BASF Wetting Agent)

高度強力展着劑沾性持久噴施各種農藥用 0.03%

BASFAPON 殺草劑

世界各地均廣泛採用之強力有效殺草劑



總代理 有利有限公司

臺北市衡陽路一二〇號二樓 電話：31198