

東南碱業股份有限公司榮譽出品



# 碳酸氫鈉

(小蘇打)

省政府衛生處衛典登字第 497 號

- (1) 本品成份純度達 99% 以上合於藥用食用。
- (2) 飼豬時摻加地球牌小蘇打可以中和雜食中之酸性避免傷害豬仔胃口。
- (3) 經常加入地球牌小蘇打於豬飼料內可以健全豬仔腸胃。
- (4) 地球牌小蘇打純度極高略食過量時亦無妨碍。
- (5) 地球牌小蘇打各地藥房食品雜貨店及工業原料行均有出售。



## 東南碱業公司

地址：臺北市中山北路二段七〇號

電話：4 7 4 2 1

三共株式會社出品



# エンドリン 乳劑

(安特靈乳劑)

成分 19.5% 包裝 300 c.c. 瓶裝 每箱 30 瓶

◎適合防治之農作物害蟲

棉花：紅鈴蟲、金剛鑽等

大豆：各種主要害蟲

水稻：螟蟲

- 特長
- ① 對廣範圍之害蟲具有殺滅效能
  - ② 藥力可以保持長久
  - ③ 化學性安定可與各種殺蟲劑、殺菌劑及肥料混合使用
  - ④ 對農作物很少藥害

出進口商 泰洋股份有限公司

地址：臺北市重慶北路二段 108 號

電話：4 4 9 9 4 號



臺灣鳳梨的收穫期，多集中在夏季七、八月間。收穫期如集中，每每使工廠無法及時處理生果。同時又因夏季高溫多濕，以致時常發生果實腐爛或過熟的現象。

本省西部的部份果農，利用電石促進鳳梨提早成熟，但是因受氣候條件的影響，效果並不穩定，甚至有時還會減輕果重。東部的鳳梨，自從臺灣公司在臺東設立鳳梨工廠，並由糖廠，臺東農業改良場及臺東縣政府積極輔導農民利用科學方法

## N A A : 調節鳳梨產期的新藥劑

丘·應·模

種植以來，單位面積的產量，已急激增高，明年夏季，每天進廠的生果量，最高可能達八百噸以上，而目前臺東鳳梨工廠每天最高的製造能力却只有四百六十噸。過多的生果如何處理，是一個很嚴重的問題。爲了解決這個問題，臺東糖廠已決定自今年開始，在各原料區大量使用植物荷爾蒙「萘乙酸」片劑 (N A A)，以調節鳳梨產期，使生果的供應，能配合工廠設備及人力的需要。

- 使用「萘乙酸」片劑提早鳳梨開花結實，是由農復會、臺灣大學農學院、臺灣公司東臺試驗場，以及臺東糖廠等機構，在臺東各原料區農場試用，證明效果優良後，才決定擴大應用的。它的優點是使用方便，十月間處理可提早一月收穫而影響產量不大，吸芽發生早，費用經濟(每公頃片劑費用約三百八十元)。爲了使各位果農在使用時能得到良好的效果，特將「萘乙酸」片劑使用應注意的事項分別敘述在下面：
- ① 藥片須用玻璃或鐵罐密封後，貯藏在冷涼乾燥的地方，以免藥片受潮失效。
  - ② 在放藥片的前後半個月，不要施用肥料。因施肥距離太近，將影響藥效。
  - ③ 施放藥片的鳳梨，須生育滿一年，發育整齊良好。過小的植株，不要處理。
  - ④ 東部鳳梨園的處理適期，在十月初到十月底，過早過遲，效果都會受到影響。
  - ⑤ 施用時應選擇晴天施行，雨天易使藥片溶化，每株用一片，須將藥片投於蕊部，使與蕊部水分接觸，以便溶解。爲使藥片準確落入蕊部，可用上端裝有漏斗的塑膠管插入蕊部，然後將藥片投入塑膠管中。
  - ⑥ 投藥片時，假如發現鳳梨蕊部沒有水分，或水分過少而不能使藥片溶解時，應於施用前在鳳梨蕊部加入少許潛水。
  - ⑦ 經過處理的鳳梨，提前抽穗半月或一月，所以，收穫前最後一次施肥的時間，也應提前半月或一月。