

有些玩具很危險



做父母的，只要手頭有錢，誰不喜歡給自己的寶貴玩具？尤其是帶着寶貴進城的時候，街頭到處都是玩具，紅紅綠綠，形形色色的玩具，最逗人喜歡。孩子們看到了，更非拉住父母購買不可。

這些玩具中，有些是很危險的，購買的時候必須詳加研究考慮。玩具的危險性，不但與製造的材料和構造有關，孩子的成長程度和習慣，也是構成危險的因素。同一樣玩具，對五個月大的孩子可能很安全，對一些大的孩子就可能危險萬分。

例如油漆類的玩具，就是不適合五、六月的嬰兒。油漆有毒，五、六歲的嬰兒都有吮

咬的習慣，因此很容易把毒質吃進去。彈珠也是一樣，小娃娃拿到東西就往口裡放，因而有吞入腹內的危險。用硬塑膠製成的玩具，如小喇叭等，有跌破刺傷身體的危險，一歲多的孩子，口裡嚼着一隻破裂後鋒利如刀的小喇叭，東跑西跳，想想看該是多麼危險？

也有許多玩具，當小孩一個人玩的時候，沒有甚麼危險，但是如果兩個小孩一起玩，就可能危險萬分；餅乾筒、尼龍袋之類的玩具就是。當母親忙的不克分身把小孩交給小哥哥或小姐姐照顧的時候，這點應特別注意。在美國，有一位大意的母親，把一件包內衣的尼龍袋順手丟給孩子們玩，沒想到當她分身回來的時候，

竟發現大孩子將尼龍袋套在小兒頭上，然後又將袋口束起來，把孩子活活悶死了。尼龍袋透明不透氣，但孩子們有幾個明白這個道理？

一兩年前，臺灣報紙上也登載過一個類似的故事，說有一個四五歲的小兒照顧他的未滿一歲的弟弟，將一個餅乾筒套在弟弟的頭上，套進去倒沒了費多大事，拿出來可就難了，弟弟的脖子弄的到處是傷，後來還是大人用其他辦法把餅乾筒破壞了事。餅乾筒破壞後，非常鋒利，小孩又不懂事，頭在筒內亂搖亂動危險可知。

總之，為孩子選擇玩具的時候，對玩具的性質、構造、孩子的年齡、習慣以及是單獨玩，還是共同玩，都應該有所考慮。

預防

白喉

百日

咳

衛生院最近呼籲大家趕快攜帶六歲以下的小孩到各衛生所去注射白喉和百日咳混合疫苗，而且每個小孩必須注射三針，才能有效地防止白喉百日咳的傳染，凡是過去沒有注射過這種混合疫苗的小孩，要趕緊去注射，已經注射過兩針的，也應該補行注射第三針。

據衛生當局指出，白喉大多發生於每年八月到第二年的三月間，患者都是六歲以下的小兒，大人感染此症者極少，過去各年中臺北市有很多小孩都感染了白喉，今年由於白喉和百日咳混合疫苗的普遍注射，患白喉症的人已大為減少，可是到目前為止，接受白喉預防注射的兒童並不踴躍，這是大人不注意為自己兒童預防白喉症的現象，今後為了徹底防止白喉的發生，衛生當局希望六歲以下的兒童一律要接受白喉預防疫苗。

您府上的小寶是否已經接受過預防注射呢？做父母的最好不要忽略了這個問題。

六歲以下兒童 趕快接受注射

嬰兒的發育標準

一個發育正常的嬰孩，在某一段的時期內，有其一定的行動能力，除非是有了疾病，缺乏營養，或是畸形發育，才會有着不正常的現象。

左面的十二個圖代表了一個嬰孩在十二個不同時期中的應該有的各種行動，如果您的小寶寶出生後的發育過程是和這些圖解完全一致的話，那就是一個很健康的嬰孩了。

(一) 出生後兩個月的嬰孩用手扶持他，可以站立一會兒。(二) 三個月大的嬰兒可以抬頭看看高處的東西。(三) 四個月大的幼兒會翻身打滾。(四) 五個月大的小孩能夠抬頭挺胸。(五) 五個月大的小孩也會雙手抓東西。(六) 六個月大的小孩可以獨自坐在欄椅上玩。(七) 七個月大的小孩可以自己坐起來。(八) 八個月大的嬰孩已經會爬行。(九) 九個月大的小孩可以靠著一件東西站起來。(十) 十二個月大的小孩大人用手可以拉着他走路。(十一) 十四個月大的小孩自己會站立。(十二) 十五個月大的小孩會自己走路了。

