

花生

適時

收穫

提高

品質

產量

早熟種晚熟種 收穫期不同

目前本省栽培的花生品種，有大粒種與小粒種兩類。所謂大粒種，是匍匐性或半立性的晚熟種，在澎湖及彰化雲林一部分海濱地區種植的「鴛鴦豆」、「大有」、「立枝仔」等，都屬這一品種，每年種植一次，生長期一百五十至一百八十日。

所謂小粒種，是直立性的早熟種，本地種、「油豆」、「老公仔豆」，以及目前推廣中的「臺農一號」、「青島」、「臺南白油豆一號」、「臺南六號」、「臺南七號」等品種，都屬小粒種，生長期一百一十至一百三十五日。因為早熟種與晚熟種的生長期不同，所以收穫的時期也不同。

四個月收穫並不十分可靠

在臺灣栽培花生，九〇%以上為小粒種。一般農友都知道，小粒種自播種至收穫所需時間為四個月，但並不一定。

因每年氣候的變化不同，自播種至發芽，有時只需五至七天，有時却需要十五至二十天以上。自發芽至始花，有時需要二十天的時間，有時却需要三十至三十五天。這種變化，是由於雨量及溫度不同的緣故。

花生自開花後即為莢果形成時期，而這段時間是一定的（八十至九十日），因此，自播種至發芽，發芽至始花的時間愈長，則收穫時期愈晚。

始花後八十 九十日收穫最好

花生自播種至開花，常因氣候環境之不同，每年變化不定，但始花後至成熟的時間是一定的。根據農業試驗所試驗的結果，春作在始花後九


十日收穫產量最高，品質也最好。秋作時，在始花後八十日收穫產量最高。

太早過遲均影響品質產量

花生太早收穫，因莢果尚未充份飽滿，產量與剝實率都較低。過遲收穫，對產量影響較少，但成熟後莢果容易脫落，遺留土中，致使收穫不易。

所以花生收穫時期，春作在始花後九十日，秋作在始花後八十日收穫最為妥當。

註：①關於花生的優良品種，本刊將於明年一月間另刊專文報導。
②「花生留種」以及「花生栽培法改良要點」二稿，也將繼續在本刊刊出。
③關於花生栽培，各位如有其他問題，可直接寫信向「臺北市公館農業試驗所林興先生」詢問。



畜產省台灣交送農林廳經
試驗所試驗結果證明
一次見效 效果100% 絕無副作用
比配拉淨製劑猪驅虫新藥

奇效

猪仔面蟲藥

用法簡便且價錢又便宜

每隻小豬藥費僅需二至三元

小豬，體重每公升用0.5瓦中豬用0.42瓦大豬用0.34瓦
計算以混合飼料中做一食，不需再給任何藥劑，
三至六天中可以使豬解出，龍可使豬隻快肥又快大。

農會·藥房·飼料店均售
製：臺南市 德生西藥房 民權路133號

臺南市 元山製藥廠 復興路10巷42號

經過服用此藥後！

未服用此藥前

情形完全不同！

包裝·定價

20公分	1000
100	4500
450	18000

郵購：劃撥南字30014
徵求經銷處