

成白癩狀而漸變紫色，並成爲爛狀，處理方法如何？(彰化竹林黃東選)

【答】：一、你的鴨是患內寄生蟲太嚴重而致死，管理上應注意環境清潔衛生，並定時給予驅蟲藥。二、你的小雞可能是患慢性球蟲病而致死，管理上應注意保持乾燥，治療可應用備服類藥，每百公分混合飼料加消痰片兩片(磨粉)混勻飼與，連續服此含藥飼料三天，早期即治療效果甚佳。三、鴨的病可能與火雞所患不同，不可亂用藥，家禽有病應即請附近獸醫診治爲妥。四、小雞患白痢現尚無特效藥可供治療，只有嚴格淘汰後，鷄舍及用具嚴格消毒，保持清潔，避免傳染。五、公鷄冠白癩可用刀片括去使露有出血，然用藥酒塗抹，即可治療。(李登元)

會行動。經過十幾天多不會死掉，故黃是白黃色，是否有病？二、還有一種①肉冠冠尖變黑。②行動好像歇歇一機。③口腔有粘液。④鼻腔呼吸困難，流出鼻涕。⑤肛門有白痢徵象。⑥經過一天左右全部不會飲食。⑦經過二天就死掉，請問這一種什麼病？(彰化縣張政華)

【答】：一、鷄隻會食，飲水，脚骨軟不會行動，是缺乏礦物質補充飼料如骨粉，及缺乏維他命丁而發生的軟骨症。在飼料中應加一%骨粉，同時飼料中應加粗魚肝油。三%以補充維他命丁。如鷄隻每日有接觸日光一十二小時的機會，魚肝油可以不要補給，因爲光線中的紫外光線，可供皮膚內的物質變成與維他命丁同功效的物質。二、據你所說的情形，你的鷄隻死於傳染病無疑。因爲病情複雜，很難判斷，但很可能是新城病與霍亂病同時併發。總之鷄隻在流行病發生之地區，鷄隻應按期注射新城病及家禽霍亂病兩種預防疫苗，較爲保險。(李登元)

【問】：①我的「山羊」部份生了「八腳」應如何預防與治療，請示知。②「山羊」下稀糞與「咳嗽」如何治療？(彰化張宏範)

【答】：一、你說的「八腳」，沒有附蟲的標本或繪圖，我不知是何種，普通「牛壁」也寄生於山羊體外吸血，吸飽後很像黃豆那樣大，不知是不是的？如是，可用BHC乳劑噴霧於羊身體外部，用毒魚藤煎水也有效，此外，現在德國拜耳藥房出品的一種叫Asuntol)是很有效，但還在試驗中。

【問】：一、你的鴿子是寄生有「吃羽蟲」的緣故，使羽毛脫落，同時刺激體使不安。環境不清潔，糞草不當更換，就易發生。二、不是營養與遺傳的問題。三、治療方法應用硫磺粉五十六公分，肥皂粉二十八公分，對三千八百立公分水調水溶液浸浴之。(李登元)

【問】：一、你的鴿子是寄生有「吃羽蟲」的緣故，使羽毛脫落，同時刺激體使不安。環境不清潔，糞草不當更換，就易發生。二、不是營養與遺傳的問題。三、治療方法應用硫磺粉五十六公分，肥皂粉二十八公分，對三千八百立公分水調水溶液浸浴之。(李登元)

【問】：一、你的鴿子是寄生有「吃羽蟲」的緣故，使羽毛脫落，同時刺激體使不安。環境不清潔，糞草不當更換，就易發生。二、不是營養與遺傳的問題。三、治療方法應用硫磺粉五十六公分，肥皂粉二十八公分，對三千八百立公分水調水溶液浸浴之。(李登元)

【問】：一、你的鴿子是寄生有「吃羽蟲」的緣故，使羽毛脫落，同時刺激體使不安。環境不清潔，糞草不當更換，就易發生。二、不是營養與遺傳的問題。三、治療方法應用硫磺粉五十六公分，肥皂粉二十八公分，對三千八百立公分水調水溶液浸浴之。(李登元)

【問】：一、你的鴿子是寄生有「吃羽蟲」的緣故，使羽毛脫落，同時刺激體使不安。環境不清潔，糞草不當更換，就易發生。二、不是營養與遺傳的問題。三、治療方法應用硫磺粉五十六公分，肥皂粉二十八公分，對三千八百立公分水調水溶液浸浴之。(李登元)

請全省獸醫師養豬養雞業者注意！

### 阿司卡利肯 (粉劑) Asakariken

(內藥登字第一四六四號)

【適應症】：豬、雞之蛔蟲症、結節蟲症、鞭蟲症。效力強大，殺蟲之力量百分之九十五以上。比任何一種驅蟲藥超。成蟲、蟲卵均死滅。絕無副作用。用法簡單，投藥前不須絕食，服後不須使用瀉藥。價格最廉，一磅一元，成鷄一隻僅五分代價，可獲得數百倍利益。

注意：「使用「阿司卡利肯」，添加飼料投與時，飼料須要乾或濕的程度，切勿放入水飼料裡」(會嘔吐)

日本東芝製藥株式會社榮譽出品


總代理 臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司

臺北市信義路二段一二〇號

### 讓售美國名廠碾米機

本公司備有美國名廠 Engelberg Huller Co., Inc. 所製碾米廠設備兩全套每套有穀磨一部糙米磨及糙米連磨光機各四部隨同清穀機雜物分離機及白米三千斤全部工作皆自動進行直至碾出白米爲止有意購買者全套或分購碾磨機均可取價從廉。購機時可向各地土地銀行申請貸款

Huller and Polisher US \$ 450.00 50% Discount NT \$ 9,000.00



糖米連磨光機 司公限有份股產物國中 地址：北臺中市北山路二號一三九 電話：四二五九

消滅地下害蟲特效之藥



## 三共へプタ 粉劑

成分Heptachlor (三共聯必達)

粉劑：成分 2.5% 包裝 3 公斤 紙包，箱 8 包  
乳劑：成分 20% 包裝 300cc 瓶裝，箱 30 瓶

- ◎適合防治旱地作物之地下部害蟲：甘藷象鼻蟲，甘藷葉葉蟲，金針蟲，切根蟲，蔬菜象鼻蟲，大豆根潛蠅，夜盜蟲，根蚜蟲，蝶蝸，蝶蝸，雞母蟲，螞蟻，瓜蠅，玉葱蠅，黃條葉蚤，蔬蚧馬等
- ◎價格廉宜，用法簡便，效力持久，人畜安全
- ◎詳細說明書函索即寄

出進口商 泰洋股份有限公司 臺北市重慶北路二段 108 號 電話：4 4 9 9 4 號