



應用農藥 安全第一！

各種新式農藥，多對人畜有毒，使用時偶一不小心，就有中毒的危險，所以用藥時，請切實注意下列事項：

- ① 噴藥時要戴帽子、防風眼鏡、口罩、橡皮手套、穿防護衣（例如塑膠雨衣、長統膠鞋等，絕對避免皮膚與藥液接觸）。
- ② 一定要用好的噴霧器。使用前必須用清水檢查噴嘴有無漏水，橡皮管是否密切連結，開關有無止水，噴口是否暢通。
- ③ 按照規定倍數配藥，切勿任意提高濃度。乳劑原液用酒杯倒出，絕對不可沾到手上。原液倒入水中後，用竹棒攪拌均勻。
- ④ 噴藥前先看風向，一定要順風向倒退噴藥，避免與藥霧接觸。噴藥時間每人每天不得超過四小時，未成年、老年人及身體軟弱的人，都不應擔任噴藥工作。身體不舒服時不要噴藥，噴藥中途如覺不舒服時，應立刻停止工作，請醫生診看。
- ⑤ 萬一不慎皮膚觸及藥液，應立即用肥皂洗淨，如果微量稀釋液進入眼部，應立即用食鹽水、食鹽九份，水一千份）沖洗十五分鐘以上。清水、肥皂及食鹽水應隨身帶到田間備用。噴藥時不要或煙喝水，噴藥後全身用肥皂洗淨，嗽口，休息後，始可吸煙、喝水、吃飯。
- ⑥ 噴過藥的農田四角應插紅旗，禁止人畜進入。空藥瓶必須深埋土中。沾有藥液的用具，如衣服、口罩、手套、膠鞋等，用過後用肥皂洗淨收存。
- ⑦ 如發覺中毒現象，應儘速送醫院或請醫生診治。醫生未到前，可採用下列急救措施：(1)誤服時，用手指按壓咽喉，使胃內毒物吐出後，飲下大量溫水，再使嘔吐，反覆施行，至胃內容物全部吐出為止。(2)使解臥於空氣流通的地方。(3)呼吸困難時，施行人工呼吸。(未完)

