

的育生響影體猪生寄

蟲癬疥孔穿與虱猪

基永李

「猪穿孔疥癬虫」與「猪虱」是本省常見的兩種猪體外寄生蟲。體外寄生蟲雖不致影響生命的安全，但對猪的生育妨礙很大，請各位養猪農友隨時注意驅除。

穿孔疥癬蟲

猪穿孔疥癬蟲常發生在皮膚皺紋多的本地種猪。成蟲體型小，圓形，雌蟲○二二五至○三五公厘，雌蟲○四至○五公厘（左下圖左），用肉眼是不容易看見的，通常寄生在猪的全身皮膚內。

疥癬蟲靠接觸傳染，一個雌蟲能產二十至四十個蟲卵，蟲卵經三至四天後孵化，脫二次皮後成爲成蟲，需時二至三星期。

受害的猪發癢，並且發生皮膚炎與營養障礙。受害皮膚逐漸變厚，形成皺褶，皮毛粗剛，失去光澤，看起來好像象皮病。又常因發癢與磚牆磨擦而發生皮膚損傷。


猪虱

猪虱通常寄生在猪的背部、頸部及腹側部等的表皮上，長毛的種猪，發生較爲普遍。雌蟲四公厘，雌蟲五公厘（左下圖右）。雌蟲產梨子狀的蟲卵，粘着在猪毛上，數天至三十天內孵化成仔蟲，然後在兩星期內脫皮兩次變爲成蟲。

猪虱也是靠接觸傳染的。蟲卵在攝氏十六度以下時不孵化，但成蟲三十八天不吃東西仍能存活。

猪舍衛生不佳，猪毛多而營養不良的猪，最容易發生猪虱。猪虱吸收血液及淋巴液，而且使皮膚發癢，所以也常引起皮膚炎，妨礙睡眠，影響營養。

上述兩種外寄生蟲的防治法，首先必需改善猪舍的環境衛生與飼養管理。猪舍必需通風良好，乾燥清潔，並且要供給合理而充足的飼料。驅蟲或治療用的藥品以及方法很多，在這裡只介紹對這兩種外寄生蟲同時有效，而且使用簡便的藥劑；就是用亞砷酸爲主配成的猪皮膚寄生蟲病外用藥，現由農林廳、農復會及省農會聯合贈送全省在施行猪蛔蟲防治示範的二百個鄉鎮農會備用。農友們如發現有上述的兩



圖大放蟲虱疥孔穿與(右)虱猪



賽文 (セビン)

50% W.P.

SEVIN

美國 UCC 榮譽出品
〔現貨供應〕

無色無臭最低毒性新殺蟲藥劑
經銷商兼設賽文服務處



- | | | |
|-----------|-------------------|-----------|
| 蓬萊農產行 | 臺北市永昌街二號 | TEL 46732 |
| 三和益農藥供應社 | 臺北市西園路二段129巷1街12號 | |
| 農友農藥行 | 桃園鎮中正路103號 | |
| 惠農行 | 中壢鎮大同路114號 | TEL 202 |
| 新竹青果運銷合作社 | 新竹市西大路105號 | TEL 25 |
| 華信隆行 | 新竹市中華路239號 | TEL 573 |
| 永信全農藥行 | 大甲鎮順天路69號 | TEL 31 |
| 國泰農藥行 | 臺中市三民路1段175號 | TEL 3343 |
| | 臺中市興中街83號 | TEL 4384 |

- | | | |
|-------|----------------|----------|
| 廖秋種子行 | 員林鎮中正路93號 | |
| 豐益行 | 新營鎮中山路192號 | TEL 239 |
| 華南貿易行 | 臺南市民生路102號 | TEL 2885 |
| 慶豐行 | 鳳山鎮第一市場內 | |
| 南農行 | 鳳山鎮第二市場內 | |
| 瑞興行 | 屏東市中央市場第三商場七號 | |
| 祥瑞行 | 宜蘭市光復路98號 | |
| 玉里友行 | 花蓮縣玉里鎮 | |
| 友種行 | 臺東鎮更生路(馬蘭)192號 | |
| | 臺東鎮中山市場29號 | |

臺灣總代理：孚美行 TEL 31449

臺灣總經銷：華南貿易行 TEL 47588(臺北)
TEL 2885(臺南)

※「賽文」說明書函索即送 連絡處：臺北市天水路 11 號