



# 常見六種乳羊疾病

陳登訓

## 胃腸炎

因採食酸酵的變質飼料或不容易消化的粗硬飼料而發生。

病羊食慾反芻不振，下痢，消瘦，衰弱。

改餵營養豐富，消化容易的飼料。便秘時，可先給與芒硝五十分，水三百立方公分(%)，然後再以龍胆末五公分，人工鹽五公分，服性鎂二公分，混合每日餵給三次。止瀉劑可用次硝酸銻鉛三公分，活性炭末五公分，每日餵給三次。

## 第一胃食滯

因採食過多乾燥而養份少的粗飼料，運動不足，或腸胃衰弱等而發生。

病羊食慾喪失，反芻停止，背鬱，流涎，呼吸困難，結膜充血。

治療法：輕者以芒硝一百公分，水二百立方公分內服。重者同時以微溫肥皂水灌腸排便，再以苦味酞十立方公分，稀鹽酸五立方公分，水二百立方公分，混合每日內服三次。

## 鼓脹症

因採食容易酸酵的青飼料(如雨後或浸過水的豆科作物及生甘藷、甘藷藤等)過飽而發生。

病羊發生劇烈腹痛，腹部膨大，打診時發出鼓音，呼吸困難，食慾反芻不振，結膜充血。

可將病羊前驅昂高，摩擦膝腹部，並壓迫腹部，使吐出氣體。

治療：以重曹三公分，微溫水二百立方公分，溶解後給與。或以安母尼亞水五至十立方公分，水二百立方公分，混合內服，制止氣體發生，然後以人工鹽五十公分，水三百立方公分，溶解後給與，並注射強心劑一〇%「安那加」液五至十立方公分。

## 腰痲痺

此病在夏秋兩季發生較多，由蚊子為媒介傳染。

病羊腰部發生痲痺，步行困難，橫臥不能起立，甚至消瘦死亡。

本症需要早期發見早期治療。首先冷卻頸部，並以芒硝八十至一百公分，水一公升，溶解後給與，同時以微溫肥皂水灌腸。不論營養情形如何，抽血一百至三百立方公分後，再注入同量的「林格兒」氏液。神經興奮時用溴化鉀三至五公分，水三十立方公分，溶解給與，連續一星期。

舍內必須通風良好，並以アネチン劑，或士巴多靈一繼續注射五日。「士巴多靈」也可用片劑。

## 胃蟲症

胃蟲有三種，其中最厲害的是捻轉胃蟲。病羊發生貧血，營養不良，下痢，食慾減退，精神萎靡，尤其以幼羊受害最為嚴重。

每月驅蟲一次，用一.五%硫酸銅液，或羊一百至一百五十立方公分，仔羊五十立方公分。或以一%硫酸銅液加同量一%硫酸尼古丁液，混合後給與，用量與前者相同。投藥前絕食十五小時，投藥後經過三至四小時再餵飼料。用「飛納賽淨」驅蟲效力最好。

## 條蟲

病羊糞中常見白色的片節，消化器官發生障礙，精神萎靡，貧血，營養不良，下痢，子羊發育受阻。

用カマラ治療效果良好。也可用一%硫酸銅液與煙草葉驅除。

最近臺大農學院李水基先生以亞砷酸鈉五公分，硫酸銅二十公分，鹽酸一.六立方公分，水四百立方公分混合溶解後，以每公斤體重用〇.五立方公分的比例，以橡皮管注入胃內，排蟲成績非常良好。

畜產省台灣省 試驗所試驗結果証明

**奇效** 一次見效·效果100%·絕無副作用

比配拉淨製劑堵驅虫新藥

# 狗仔面蟲藥



台獸牌商標

用法簡便且價錢又便宜

每隻小豬藥費僅需二至三元

小豬，體重每公升用0.5瓦中荷用0.42瓦大荷用0.34瓦，以混合飼料中一次給食，不需再給任何劑，三至六天中可以驅除腸胃中，能可使增快肥又快大。

農會、藥房、飼料店均售

臺南市 德生西藥房 民權路133號

包裝·定價
20公升 10.00
100 45.00
450 180.00

郵購·劃掛商字 30014

徵求經銷處



未服用此藥前

經過服用此藥後!

## 情形完全不同!

臺南市 元山製藥廠 復興路10巷42號