

冬天當心耕牛感冒！

食慾不振時，可用「重碳酸鈉」十五公分，「人工鹽」五十公分，「龍膽」五公分，混合後分三次給與。如有併發氣管枝肺炎之虞時，宜用「配尼西林」三百萬單位一日三次筋肉注射，連用二、三天。此外身體衰弱時，亦可用「咖啡因」混合與葡萄糖或大量生理鹽水（三千至六立方公分）及維他命B一百公絲（*mg*）施行靜脈注射，增進營養，強心，利尿解毒，使疾病早日痊癒。

俗語說：「預防重於治療」，耕牛感冒，平時須注意預防，不使發生，以減少危害。其有效預防法如下：

①改良厩舍：耕牛內厩舍

劉樹遠

此外尚有便秘、下痢、惡心及輕微鼓脹等消化障礙，如有併發症時症狀更為險惡，有的會轉為慢性而極度衰弱。

當你發現耕牛有上述症狀時，須即採用下列處置：給以充分休息，停止用役，把牠移置於一個空氣清新，清潔乾燥溫暖的厩舍內，厚鋪乾草，任其自由休息睡眠，時常給與清潔的飲水和新鮮幼嫩的青草，及富於滋養容易消化的飼料，且須時常牽出來運動，用柔氈摩擦全身，以利血行。如此好好的調養，約經過一個星期後即可恢復健康。

冬天當心耕牛感冒

至於藥物療法，可用「阿斯匹靈」二十至三十公分，一日分三次灌服，或用A、P、C錠四十至六十粒（每粒〇・五公分），研碎後一日服用三次亦可。

- ② 注意用役：工作不可過勞，每當用役經五十分鐘至一小時後，須休息十分鐘，以便恢復疲勞。連續的經過四、五小時繁重勞役後，須行大休息一至二小時。同時輓曳量不宜過重，以免傷害身體。
- ③ 注意飼養：飼養須有定時定量，所用的飼料，宜新鮮清潔，富於滋養容易消化。不可使用腐敗不潔的飼料，以免傷害腸胃，發生疾病。
- ④ 隔離消毒：當耕牛發生感冒後，須即行隔離消毒，另行飼養，不可混合於健康牛群中，以免蔓延擴大。



三共へプタ 粉乳 劑劑

電話：4 4 9 9 4 號

[illegible]

トランスプラジトン

臺北市漢口街1段39號 電話 26538

(13)