



農藥的話就是 正豐農藥

A 農 愛 用	正 豐 巴 拉 松 (47%)
B 農 也 愛 用	正 豐 巴 拉 松 (47%)
C 農 又 是 愛 用	正 豐 巴 拉 松 (47%)
莫怪用過的人都說愛用	正 豐 巴 拉 松 (47%)
靈 丹 劑 15%	嚇 必 達 劑 20%
地 特 靈 劑 18.5%	安 巴 乳 劑 30%
安 特 靈 劑 19.5%	馬 拉 松 乳 劑 50%
P M 乳 劑 50%	

◎全省各鄉鎮農會農藥行均售
正豐化學股份有限公司

住 址：臺中縣霧峰鄉草湖路二號 電話：63
連絡處：臺中市復興路四段三九號

害病的藥劑。)

二、多穗是否還能防治除稻紋枯病以外的病害？(雲林縣張俊源)

【答】：一、請參閱豐年第十卷二十一期刊登混合圖。

二、多穗在本省主要用來防治稻紋枯病。

據外國報告尚可防治馬鈴薯疫病、蕃茄葉霉病、小麥白澀病等。在本省，防治柑桔流膠病時，可將病患部切後塗抹多穗一〇公分，加石灰二〇〇公分調成的糊狀液。(劉和元)

柑桔裂果由於乾濕失調

預防要注意適量灌水等

【問】：柑桔開花後四一五個月，柑仔就漸漸開裂，數天後果實變黃落下，此是何緣故？每株平均大約開裂的果實有一公斤以上，請問有何方法可以防治？(雲林縣張文山)

【答】：柑桔果實在發育期中發生裂果，乃是一種生理現象，由於土壤乾濕失調。最初是於土壤中水分不能適量供應，久旱之後，

遇到大雨，常會使果皮裂開。預防方法：

①於乾旱時注意適量灌水。

②或用稻草落葉等鋪蓋樹下，保持土壤水分，勿使大量蒸發損失。

③或在樹間栽培綠生作物，以保持土壤之適度潤濕。(蔡致讓)

防香蕉萎縮病可用石灰消毒

香蕉施肥不宜單獨施用鉀肥

【問】：有關左列香蕉病害數問題，祈予賜覆。

一、種香蕉萎縮病之植株，將全株帶塊整掘出後，原跡地撒BHC消毒，立即再栽新植株，是否可避再罹病？

二、香蕉施肥僅單獨施鉀肥是否有效？

三、單獨施鉀肥僅單獨施鉀肥是否有效？

【答】：一、關於種香蕉萎縮病之植株將全株帶塊整掘出後原跡地撒BHC消毒，立即再栽新植株是否可避免再罹病問題。

香蕉萎縮病為一種毒素病，在原地撒BHC消毒並無效果，因BHC為殺蟲劑，原地如立即再種香蕉仍易感染該病，應將植株全部掘出，使土壤曝曬陽光，並施以石灰消毒，經五、六個月以後才可種植新株。

二、關於香蕉施肥僅單獨施鉀肥是否有問題。

香蕉雖然需要鉀肥很多但是香蕉具有巨幅葉片並且生長結果期短，仍需適當之氮肥、磷肥，以促進植株之發育與結果，單獨施鉀肥效果較不顯著。根據嘉農試驗分所與高雄青果合作社在屏東試驗結果，香蕉每株應施硫酸六〇〇公分，過磷酸石灰七〇〇公分，氯化鉀七〇〇公分。

三、關於單獨施鉀肥是否有效？硝酸鉀是否可與氯化鉀過磷酸鈣混合同施問題。

硝酸鉀是含氮的肥料可促進香蕉生長，但要使產量增加必須施用磷酸與加里兩種肥料來補充肥效，硝酸鉀含有石灰，呈微鹼性反應，不宜與酸性肥料混合施用，故不宜與過磷酸鈣混合同施，可與氯化鉀混合。

但宜即時施用不宜貯藏。(朱慶國)

飼養肉用牛應有廣大土地

牧草種植等可予技術協助

【問】：本家為謀謀民福利，從事增產起見，擬舉辦畜養肉用牛，惟對牛種採購飼養方法病患防治及其生育繁殖等毫無經驗。敬請惠予指導。(雲林榮譽國民之家朱先坤)

【答】：飼養肉用牛，牛應有廣大土地問題可種植優良牧草，飼料作物或附近近有廉價優良之副產如鳳梨渣、酒粕、糖蜜等以為其飼料。如有土地，牧草等之種植，農復會可作技術上之協助。品種可用本地黃牛為基本牛配以肉，牛公牛或其精液。病患可請當地農會領公所以及縣政府家畜疾病診斷所獸醫協助防除。(農復會方清卿)

農友們接到農業普查的通知後，請於訪問當天，在家等候！

興農大梅花新消息

今年二月十五日所舉辦興農大梅花葡萄品評會，評品結果，曾玉蘭農友獲得特等獎，獨得獎金參百元。他住在竹東鎮鎮林里5鄰66號。他採用興農大梅花有五年之歷史。

他今年特別提早在九月中旬栽培。據說至十月底已有一公斤大之葡萄。並且內質外觀俱佳。他自信明年二月十五日品評會，將會再度獲得優秀的成績。最後他附帶說：「以他個人的經驗，想參加明年品評會之農友，最好在十二月十日以前播種為宜」。

興農大梅花葡萄之親王，蕃茄新種子入貨了！福壽二號，赤福三號，大型赤福，交配世界一，赤福一號。

王將白菜試作用一袋10元四川榨菜尚有少量種子可供應。

興農園藝新知識函索請付郵票四角。

請顧客注意：目前有人冒用本行興農大梅花名稱，到處行騙。凡是無直接向本行或員林分行採購，而感遇到種子有疑問者可直接函詢臺北本行。當可獲得詳細說明。

又請各地同業者非向本行採購之大梅花，請不要冒用興農大梅花名稱欺騙農友，以維護商標。

興農種子行

本行：臺北縣三重鎮重新路一段43號
電話：四五三三二 郵政劃撥四〇二八號
分行：員林鎮民生路274號