


種留行自蔔蘿「花梅」 率芽發好較證保可



「梅花」種蘿蔔，是本省冬季裡作栽培普遍的
一種蔬菜，爲了保證較好的發芽率，希望農友們自
行留種。

選擇優良母株

「梅花」種蘿蔔的系統很多，其中，最重要的
有「浮頭」、「梅花仔」及「平頭」三個系統
。在普通栽培田中，於收穫前，選擇具有品種特性
的優良植株，留供採種之用。品種特性可由葉部的
形狀、大小、顏色，以及根部的形狀等看出。各系
統的地上部特徵如下表所示，根部形狀請參看右圖。

系統名稱	葉色	葉形	葉毛	株型
平頭	濃綠	葉緣缺裂呈羽狀，葉片大	多	橫匍
梅花仔	綠	葉緣缺裂，葉片稍圓	少	稍直立
浮頭	濃綠	葉緣缺裂，葉片細長	稍多	橫匍

小規模採種時，最少要選留二十株以上的母株，
混合採種。不可單株採種，以免退化。

經選拔的母株，應即移植於採種圃。採種圃應

選耕土較深，富有保水力，而且排水良好的壤土或
粘壤土設置。酸性至微酸性的土壤均可。砂質土因
乾濕不均，成活較差。
母株的根端無須切斷。葉基部應留十二至十五
公分長，以幫助成活及生長。但是留葉過長時，反
而不妥。

行距七十公分，株距四十五公分。「平頭」系
統直立栽植，其他的採用斜植方法。

栽植時，須用手將表土密填於肥大根面，以促
進成活。有病害發生可能的土地，應於栽植前用一
千倍「烏斯普龍」液消毒植穴。

分二次施肥

肥料：
一公畝（百分之一甲地）採種圃，約需下列的

肥料種類	總量	基肥		追肥	
		第一次	第二次	第一次	第二次
堆肥	二〇〇公斤	二〇〇公斤	—	—	—
尿素	三・六公斤	—	—	—	三・六公斤
過磷酸鈣	四公斤	四公斤	—	—	—
草木灰	一五公斤	一〇公斤	五公斤	—	—

第一次追肥在定植後三星期時開溝施用。第二
次追肥在抽苔初期施用。

驅蟲防風摘心

定植成活後新芽開始生長時，應留意驅除蚜蟲
。必要時噴射二千倍PM液，並施用四百倍「大生
」液二至三次。施用石灰波爾多液易引起嚴重的藥
害，千萬不要使用。
季節風較強時，須立竹桿爲支柱，並行培土，
以防倒伏。

於開花初期，將花苔先端生長點摘除三分之一
，以調節成熟時期，並使種子大小整齊。

整株一次採收

大部份莢果變黃時，整株一次採收。在晴天時
，放置於屋外曝曬，並藉夜露使莢果面稍行發酵變
脆，以便種子脫落，但不可遭長期（三天以上）雨

淋，以免種子在莢果內發芽。所以，雨天應懸掛在
屋簷下風乾。充分乾燥（莢果發生脆聲）後，於下
午三時許，用竹桿或赤腳踏破莢果，調製種子。

結球白菜的糊仔栽培

桃園縣八德鄉 呂顯玉

結球白菜利用糊仔法栽培，在本省
中南部已相當普遍，然而在桃園一帶，
還是比較少見的。筆者服務於八德鄉農
會，訪問鄉內農研班員利用糊仔法栽
培結球白菜，現在將他的經驗與方法，報告給
「豐年」的讀者。

本來結球白菜不用糊仔法，就是等到水稻
收割後才栽培，也不致影響翌年第一期作的插
秧。利用糊仔法栽培，目的是在爭取早期市場
，多得收益。

結球白菜糊仔栽培，有直接下種和育苗後
移植二種方法。不管那一種方法，糊法大致是
一樣的。糊下去的時期，是水稻收割前二十天
至二十五天。

選擇排水良好的水田，用小鏟將四株水稻
成正方形的中心點鏟鬆，併將隣行的土壤移一
點過來，混合腐熟的堆肥，做成如飯碗倒置狀
的土堆，這就是要糊白菜的地方。每隔二行糊
一株。在這兒要注意的是，土堆中央不可凹下
，以免根部由於浸水過多而發生腐爛。

種子或種苗種下後，水份是不可缺乏的。
但是在稻田內澆水是很不容易的
事情，所以要以溝灌方式，引水
灌漑，但是水位絕對不可超過土
堆二分之一以上。引水最好的時
間是黃昏。

等到水稻收割後，應立即培
土築畦，並行中耕。至於除草、施
肥等工作，都與普通栽培法一樣，
各位可以按照過去的經驗去做。

