欲使柑果多結可用2·4-D稀液用豆餅作肥料宜酌加磷鉀肥

【問】：一、欲使柑果多結果，且不易落果，本省曾否利用植物激動素（賀爾蒙）處理？二、利用猪食豆餅一經長期浸水發酵，去施用於柑桔，其方法是否合理？（屏東縣邱振順）

【答】：一、欲使柑果多結，增大果形及減少熟前落果，可噴佈二·四-D稀溶液。濃度爲二二ppm每株成熟樹噴一二—一五公升，在大量落果前二天噴佈。此時期大約在四、五月間，仔細觀察，卽可知道。二·四-D是一種兇猛的藥劑，用量稍濃時可以除草，也會使柑桔樹受傷，使用時必須十分小心。①稀釋時不要稱錯。②噴佈時期不適宜，會引起藥害。③使用過二·四-D的噴霧器要洗得十分乾淨。以免以後噴藥時引起藥害。二、豆餅浸水醱酵後施柑桔，當然是好的，可惜價格太高，豆餅所含肥分，主要是氮肥，所以施用時宜配加磷、鉀肥料。豆餅成分如下：氮六·五六%，磷酸一·三七%，鉀素二·一四%。其配合法及施用量如下：（每株施用量）——柑桔。

	四—八年生	九—一三年生	一四—二〇年生
豆餅	四三五公分	八八五公分	一一〇〇公分
骨粉	二六三	五三六	六六四
硫酸鉀	一九五	三九八	四九五
過磷酸鈣	一六九	三四一	四八四
硫酸鉀	二五一	五一四	六三八
堆肥	三六〇〇	四八〇〇	六〇〇〇

分兩次施用，一月至二月間施有機肥料，六月施化肥此較經濟的有機肥料有棉子餅、鷄糞、猪牛糞、人糞尿等。（蔡致讀）

白花芥藍菜採花苔爲主省內市場銷路已漸擴大

【問】：①於豐年月刊第十卷第十九期裏之第八頁內，閱到蔬菜之新品種：所謂白花芥藍菜，是甚麼正名？（是格藍菜否）②所謂銷路，是本省內之市場的銷路或外銷，或者工廠機關之銷路？③其種子之供應處（採購處）？（彰化市李勝雄）

【答】：一、芥藍菜之俗名係「格藍菜」，芥藍菜有二個系統分爲白花及黃花，黃花芥藍菜已在本省普遍栽培，但白花芥藍菜最近才被人家重視。二者之栽培方法及採收目的少有不同，白花芥藍菜採收苔花爲主，葉及葉柄爲副，黃花芥藍菜採收菜葉爲主，苔花爲副。二、省內之市場銷路漸漸擴大，尤其外省人最喜歡，在廣東菜館銷路甚佳，因菜蕊價值高，栽培容易適於家庭園藝。三、向種子行採購，目前數量澄少，採種用之種子，（原種）均係進口種子。四、越南、泰國特別需要大量白花芥藍菜種子。（王進生）

小猪如患慢性肺炎症應早期注射磺胺類藥

【問】：我家內養有三隻小猪，其中一隻約四十斤，在一個月前染到咳嗽，不久鼻孔呼吸長短不順，最近漸漸消瘦。請問一、這種猪所染到什麼病？二、要吃什麼藥與怎樣治療？三、能不能長大？（雲林縣莊文雄）

【答】：小猪咳嗽，且鼻孔呼吸不正常，而且漸漸消瘦下去，有二種可能，①慢性肺炎，注射磺胺類藥，但要早期注射，到現在恐怕太遲了②是寄生蟲，可能在蛔蟲症初期也有如此現象，因蛔蟲的仔蟲迷入氣管，像這種猪，如不治好，當然影響他的生長。你最好請獸醫師看看。（黃立祥）

高牆桶柑是濃紅橙色是本系統中最優良的

【問】：我於卅九年已種有高墻桶柑（黃皮的）成綠普通，今想在明春多栽五百株。但有苗圃人介紹說紅皮的桶柑標優，是否眞假？懇請將該良種（黃、紅皮）之優劣賜示。（苗栗縣造橋鄉李德坤）

【答】：桶柑的果皮，在充分成熟後呈紅橙色，高墻桶柑即呈濃紅橙色高墻桶柑是桶柑系統中最優良的系統。

既然苗商如此宣傳，你不妨等果實成熟時親自前往品嚐一番，若果眞優良，再買苗種植不遲。（蔡致讀）

石門地方建設委員會督辦
大溪菓樹苗圃
各種優良柑桔品種苗木出售
種類：雪柑、椪柑、桶柑、美國甜橙
美國華倫夏（又譯晚崙西亞）
訂購地點：
1 中壢鎮公所二樓
2 大溪鎮下田心子大溪菓樹苗圃
苗木特點：
1 本圃柑桔苗木接穗，都是選自經由農林廳農復會土林園藝試驗所及各柑桔病蟲害專家負責鑑定絕無黃龍病潛伏之優良母樹故可保種植之安全。
2 苗木的培植，都經具有十年以上經驗之菓樹專家常駐現場指導監工，苗木粗壯，生育良好。
3 本菓樹苗圃尚有水蜜桃，日本枇杷，日本梨等各種苗木民國五十年底卽可出售。