

初春種嫩薑，利益很優厚！

王進生

薑，又名「新薑」。新薑的栽培，與老薑的栽培稍有不同，其要點如次：

爲了爭取早期市場 種薑須經催芽處理

將種薑於早春直接定植時，需要一個月以上才會發芽出土。假如在定植前先行催芽，則可爭取時間提早收穫上市，利益較大。

利用簡易塑膠布溫床來催芽最爲適宜。溫床的設置方法如下圖。此種溫床經常可保持床內溫度攝氏二十五度以上。

種薑須用八百倍的「烏斯普龍」液浸漬三十分至一小時，然後置於溫床內。「烏斯普龍」液可繼續使用三至四次。

種薑並列於溫床內之後，用潮濕的草席覆蓋，以防乾燥並促進發芽。或用土覆蓋二三公分厚亦可，但須經常供給適當的水分至發芽爲止。如此處理約經十天後開始發芽，芽長〇·六至一·〇公分時定植於本圃。

單位面積所需種薑

比普通栽培多一倍

使用較大的種薑，所發出來的新薑必定比較肥大，數目較多，發育較快，可以提早收穫。栽培十公畝（一分地）約需種薑三百六十公斤（六百台斤），即較普通栽培增多一倍。

土地選擇適當與否 關係生長發育頗鉅


薑是淺根性的作物，不耐乾燥，又怕積水，圃場有四天以上的積水時，可致全數枯死。所以須選保水力強且通氣良好的腐植壤土或粘質壤土栽培。

嫩薑（新薑）是初春栽培有利的一種蔬菜，如能利用塑膠布（玻璃布）保溫苗床催芽，提早收穫上市，栽培利益必定更大。

隨時可以灌溉的梯田最爲理想。不可連作，否則易發生腐敗病。與煙草及芋輪作亦不宜，須注意。

提高單位面積產量 必須多施有機質肥

爲使圃地通氣良好，並經常保持適當水分計，



床苗溫保布膠塑易簡

過磷酸鈣全數和尿素、氯化鉀及人糞尿的四成作爲基肥，其餘六成分二次作爲追肥。

縮短行距增加株數 肥培管理適時舉行

用鋤頭依行距六十公分的標準，開十公分深的植溝，將經過催芽的種薑依株距二十公分置於植溝內，施下基肥後覆土三至四公分厚。新薑栽培的株距，較普通栽培爲密。單位面積的栽植株數，較普通栽培多二成，但是行距則無須縮短。

定植後四星期，舉行第一次追肥，並行第一次培土，厚三公分，不可過厚，並應儘量避免切斷根群。再經過四星期後，施第二次追肥，並行第二次培土，厚七至八公分。天氣過乾時必須灌水，時間以傍晚爲宜。

發現螟蟲宜即噴藥 病害最好事前預防

①螟蟲發生時，以噴射BHC乳劑爲佳。P.M乳劑亦可。

②從本葉展開時噴射六斗式波爾多液四至五次（每隔十天噴射一次）以預防白星病、薑稻熱病，及葉枯病等。必須加用粘着劑（理農等）。

③發見毒素病（胡瓜毒素病）時應立即拔除。④不可用帶有毒素病的種薑；種薑必須用「烏斯普龍」消毒，以預防腐敗病發生。

農業普查所搜集的資料，只做爲施政的參考，與征課稅捐無關！