

# 蠟接用樹果接嫁 率活成高提以可

—— 謹致蔡 ——

本省果農及嫁接技工嫁接果樹，他們所標榜的是嫁接的速度，一天接一千株的大師父，是大家所歡迎應用的，可是他們的接活率却很低，對柑桔只有六〇%成活。應用「接蠟」後，嫁接成活率一定可以增高，尤其遇上接後雨水頗仍，「接蠟」就會大顯神通了。「接蠟」的用途在保護切面及傷口，預防雨水及病菌侵入。

下面將「接蠟」的配法、用法，以及使用時應該注意的事項，介紹給各位讀者參考。

## 「熱用接蠟」和

## 「冷用接蠟」

「接蠟」可分為兩種，即「熱用接蠟」和「冷用接蠟」。「熱用接蠟」在常溫下為固體，應用時須加熱；「冷用接蠟」在平時為糊狀，可以隨時使用。「接蠟」的配合式很多，現在各舉一例如下：

- |    |    |    |       |
|----|----|----|-------|
| 松香 | 四份 | 冷用 | 四份    |
| 蜂蠟 | 二份 | 熱用 | 二份    |
| 牛油 | 一份 | 冷用 | 一份    |
| 酒精 | 無  | 熱用 | 二分之一份 |

松香可向五金店購買。蜂蠟可向出售蜂蜜的店或五穀店購買。

牛油不是奶油，是牛肉裏的脂肪，可向市場購買。牛油也可用豬油代替，但須先經煎熬去渣。

調製「熱用接蠟」，先將松脂與蜂蠟一同加熱溶解，再在此混合物中加入牛油，強力攪動，使它們充分混合，繼續煮一段短時間，離火，繼續攪拌放冷。這樣製成的接蠟，必須加溫溶解後才可以使用。

調製「冷用接蠟」，手續與「熱用接蠟」同，在煮好後，離火略置片刻，等它溫度稍稍降低後，慢慢加入酒精，同時攪拌。

「冷用接蠟」應用時不需加熱，隨時可用。如要貯藏，必須盛裝在密閉的容器內，以防酒精蒸發後變成一冷用接

蠟，因為酒精是很容易揮發的。


## 適合臺灣的一種配方

作者在臺灣所採用的一種「熱用接蠟」，是用等量的松香和蜂蠟配製而成，經施用結果，認為很滿意。製法如下：先把松香打碎，放入鍋中用文火熬融，再加入切碎的蜂蠟，待全部融化，充分攪勻即成，應用時須加熱。


「熱用接蠟」在應用前須加熱，可如圖一所示用一風燈，只需用火將「接蠟」煮融便於塗抹於傷口即可。不必將「接蠟」煮沸，更不宜用沸滾的「接蠟」塗抹傷口，以免燙傷樹木。

對於切接、割接、橋接、大樹的根靠接等傷口較大，而其暴露於空氣中的切面較多者，如能用「接蠟」塗抹，保護傷口，對嫁接部的癒合很有利。

對於芽接等傷口曝露於空氣中很少者，只用蠟布捲緊接合部即可，不必用「接蠟」塗抹。（未完，下期續）



燈風的熱加蠟接：一圖



子例個一的蠟接抹塗法接切：二圖

優良種子  
純良品種

每購十袋贈送一袋

鳳山農友種苗店  
鳳山鎮第二市場內  
郵政劃撥臺灣 29 號

- ① 福特好矮性菜豆
  - ② 鳳山中生花椰菜
  - ③ 鳳山晚生花椰菜
  - ④ 鳳山馬娜里蕃茄
  - ⑤ プリチャー蕃茄
  - ⑥ 桃色ビント蕃茄
  - ⑦ 鳳山ベアソソ蕃茄
  - ⑧ 略畔金大甜椒
  - ⑨ リオゴ下洋香瓜
  - ⑩ 嫩 莖 萵 苣
  - ⑪ 蜜 寶 西 瓜
  - ⑫ 當 研 交 配 一 代 西 瓜
  - ⑬ 鳳 山 紅 長 茄 子
  - ⑭ 黃 梨
  - ⑮ 早 生 包 心 白 菜
  - ⑯ 早 生 包 心 白 菜
  - ⑰ 鳳 山 白 菜
  - ⑱ 大 丸 大 和 西 瓜
  - ⑲ 歐 萊 矮 性 菜 豆
  - ⑳ 黑 刺 早 生 大 胡 瓜
- (以上每袋拾元)
- (以上每袋五元)

農友們!! 種植荔枝是農村最好的副業。但是第一要選種。第二臺灣荔枝有十餘種類，若選銷品種植者，就是一生的錯誤。第三、一來養精神，二來了本錢。三來鎮土地。

各位農友們!! 如希望種植荔枝、若無氣味者，即請撥駕來做園參觀指教、無任歡迎。

臺中縣潭子鄉頭家厝中山路十號  
林永旭荔枝苗本園

特定優待  
價格酬謝  
顧客直接  
來函訂購  
賜顧。

荔枝苗現有尺數

4尺上	3尺上	2尺上
4尺下	3尺下	2尺下
7尺上	6尺上	5尺上
7尺下	6尺下	5尺下
10尺上	9尺上	8尺上
10尺下	9尺下	8尺下