



本省四四年所訂三七五租約

本年期滿原訂租約應予換訂

【問】：木人的田一甲二分地。在民國三七年之時，租給他人耕作。後來政府創設三七五減租，所以也給他三七五減租。到民國四三年已經到六年，曾向他討回六分地自耕。到現在民國四九年，可能也是到期了，我想不知有什麼辦法可收回嗎？（嘉義縣吳正雄）

【答】：本省四十四年所訂耕地三七五租約，依照規定本年已屆期滿，原訂租約應予換訂。有關業主收回自耕及佃農繼續訂約各項標準，已由省府有關單位會商研究中。俟確定後即行轉知各縣市政府遵照辦理。前項辦理換訂租約期間，各縣市政府均將公告，屆時仍請隨時注意，以免喪失權益。（臺灣省地政局）

柑樹蛾類為害吸取果汁

可捕殺成蟲並用藥毒殺

【問】：我種植柑樹數百株，現已成熟，果實每日落果很多，已噴射，實地露、BHC、馬拉松等，均無效果。後來有一晚上，用手電燈到柑園去照，發現多隻夜蛾害蟲，所害的果實約二日就落果了。一、此種害蟲用何藥劑噴射有效果？二、幼蟲何時發生？常在何處寄生，形體如何？三、成蟲白天留任何處？（臺中縣和平鄉曾金雲）

【答】：附來標本為一枯葉蛾科一蛾類為害，該蛾以吸器吸取果汁液而使發黃落果

來信請多 利用明信片, 信中免除客氣 話, 寫明姓名 住址, 信的正 面註明農問。

可用下列方法防治之：一、夜間捕殺成蟲（該蛾在吸食果汁時不會飛動）及用BHC加熱藥毒殺。二、在果園設置誘蛾燈誘殺之，唯應各果園全部施行，否則該蛾見光集中一處為害更大。三、在人造果汁內加入〇·五%昇果放置皿內毒殺之（該蛾會飛來食）。（莊德榮）

甘藷主要害蟲為甘藷螟蟲等

預先防治可使用DDT乳劑

【問】：一、甘藷種植須要多少苗，而畦溝如何，大小如何，請詳說明見告。（以每甲地種植）二、另一點對於甘藷生長時，有害蟲在根內，被蟲害者，就抑制生長之輩（甘藷）。本鄉許多農田，時常發生，如用藥劑防治時，防治不到，因為蟲在根內，請問是何蟲害？以何藥防治？以何方法來處理？（高雄縣麟蹄鄉）

【答】：一、插植甘藷每公頃（甲）約需苗三萬株。二、畦距適當為一〇—一二公尺（三三—四〇英尺）株距約為二七—三三公分（九—一〇英尺）畦距小時株距可大一點，畦距大株距宜縮小。畦距大小與栽培的品種有關，蔓多生育旺盛的品種畦距可放大，反之宜縮小。三、甘藷主要害蟲為甘藷象鼻蟲及甘藷螟蟲，所說的為甘藷螟蟲，對於這種害蟲可預先防治，採用二五%的DDT乳劑沖淡一〇〇倍，插植前將苗成個，浸入該配好的溶液中一分鐘，插植後生育時期再用同濃度

同樣藥劑在植株近土面部分噴藥兩次，即有防治效果，同時也可兼防治甘藷象鼻蟲。該害蟲之幼蟲如已蛀入莖內，則防治效果甚小。（王俠）

雞糞含有多量的有機質

砂質地種花生可施雞糞

【問】：一、乾雞屎和磷酸肥之肥份比較如何？二、砂地種植花生，但欠乏堆肥，擬改施用乾雞屎或硫酸為基肥，以那一種經濟較合算而肥份較高？（雲林縣王錫）

【答】：雞糞之成分量水分五六%，有機質二五%，氮一六%，磷一五%，鉀〇·八%，就是含有少量之有機質，而磷酸肥料之成分如過磷酸鈣是磷酸一鈣為主成分，磷是一八%。砂質地要種植花生施用雞糞可能較施磷酸肥料好。並且再加用草木灰時收量可以增加。（吳啓東）

種植甘藷施用硝酸銨鈣好

硝酸銨鈣與硫酸銨可以混合

【問】：一、請問種植甘藷施用硝酸銨其效果如何？二、硝酸銨與硫酸銨混合放貯一、二日會不會損失肥效？三、硝酸銨與硫酸銨混合施用於甘藷其功效如何？（臺南縣邱玉書）

【答】：種植甘藷施用硝酸銨鈣之效果或許較硫酸銨好。硝酸銨鈣與硫酸銨混合使用仍是可以，混合後放貯一、二日也不至於損失多大的肥分。（吳啓東）

洋蔥幼苗耐寒成熟期宜溫暖

高冷地栽培洋蔥最好稍晚播

【問】：現已播種洋蔥（球型）種子兩磅擬栽培五、六萬株，幼苗尚稱茂盛。乃昨據友人相告，謂洋蔥雖冷涼性植物，但育苗時期氣溫應低於移植後，倘移植後氣溫反低於育苗時期，不但發育遲緩，結球必不理想，而復遭失敗。（也有說洋蔥喜冷耐寒天氣越冷病蟲害越少發育越佳收成越豐的）請問在梨山高冷地播種各種洋蔥，是否可望有收？又種植洋蔥如無堆肥做基肥，施用過磷酸鈣與草木灰等，是否合宜（再用氯化鉀與硫

酸安作追肥）？統希指示。（何積道）

Advertisement for Clinton Engine (World's Most Famous) and Clinton Engine (World's Most Famous). Includes image of the engine and text: 世界最出名 王引擎 CLINTON ENGINE 擊引頓林克 五大特點: 省油, 耐用, 有力, 起動快, 零件齊全. 最合用: 抽水機, 磨粉機, 碾米機, 榨油機, 發電機, 各種馬力: 3.3, 4.0, 6.3, 7.5, 9.6, 10.3. 巨豐貿易有限公司 地址: 臺北市民明街110號 電話: 三一〇八二九二

酸安作追肥）？統希指示。（何積道）

【答】：洋蔥的發芽最低溫度是攝氏八度左右，幼苗很耐寒，普通在攝氏零度以下都不受凍害，所以在寒冷地帶也能栽培成功，但成熟期最好有溫暖的氣候或積較為理想。高冷地的栽培最好稍晚播（十一月以後）較好，而山地的土壤多為酸性，所以宜施石灰改良土質，且缺少有機質之土壤必須充分施肥補充有機質肥料栽培成續才能提高，又洋蔥生育期需水分甚多，應考慮灌溉時之灌水才好。追肥用化學肥料就可以。（陳文郁）

金針菜可加工貯藏

目前尚無推廣計劃

【問】：目前金針菜市價雖好，加工貯藏為難。若能加工貯藏有把握時，農復會方面要計畫推廣否？（苗栗公館邱明鈞）

【答】：一、金針菜之加工：清晨摘取鮮花後浸漬鹽水中一晝夜，取出泡於開水中，然後取出曬乾或烘乾即可。乾燥之金針菜花貯藏於乾燥涼爽容器內並無困難。