

鴨的飼料配種和防病

——元登李——

養鴨與養雞一樣，必需餵給配合完全的飼料。小鴨的飼料配合標準如下：黃玉米四〇%，大豆粕或花生粕二五%，麩皮一五%，米糠一〇%，魚粉八%，骨粉一%，食鹽一%，（黃玉米可用糙米粉代替，谷子不易消化，不宜使用。）

成鴨的飼料配合標準如下：黃玉米或糙米四四%，大豆粕或花生粕二〇%，麩皮一〇%，米糠二〇%，魚粉四%，骨粉一%，食鹽一%。

絲瓜葉（菜瓜葉）除含炭水化合物外，很少含有脂肪，也不含什麼蛋白質，可是做為鴨子的青飼料是很適宜的。

陸地鴨是世界有名的一種產卵鴨，羽色為卡其色（所以又叫卡其鴨），雖有深淺的差別，但以中間色者為宜。北平鴨一雄可配五、六隻母鴨。陸地鴨一雄可配十隻母鴨。陸地鴨雖然適宜在陸地上放飼，但仍喜游水。如果圍飼沒有水池可供游泳覓食，產卵成績必定較差。

陸地鴨的飼養管理，與其他家禽一樣。鴨子雖為水禽，但當小鴨羽毛未豐時，不宜在陰冷天氣使之游水，不然則易因受寒而發生軟腳。

小鴨缺乏維他命丁，也會引起軟腳病的，嚴重時甚至可致死。又如鴨舍太擠或給與發酸飼料時，也可能引起站立不穩的毛病。除了注意改善管理外，應在飼料中加〇·三%的魚肝油。

鴨子生蛋軟壳蛋，除在飼料中補充骨粉之外，還應注意鴨子與陽光的接觸，並使鴨有在水池中充分運動的機會，這樣就可漸漸恢復正常。

小鴨及成鴨最普遍的傳染病，是家禽霍亂病，一年四季都可發生，尤其以夏季最為厲害。這病應按期注射家禽霍亂疫苗預防。

小鴨在冬季應注意住處乾燥溫暖而無賊風吹襲。夏季應注意通風良好，並保持衛生。有些鴨蛋，在卵黃上面帶有血點。這種病態是會遺傳給代的，所以，有血點的鴨蛋不宜做為種蛋。

愛護牛馬請勿超載

臺中縣 大甲鎮 曾朝鐘


記得過去每年，各有機關都用種種掛圖及標語等，勸告農友們愛護牛馬，可是在今天的農村裡，仍舊可以看到許多超載的牛車馬車。

例如火車站的運輸業者，在搬運肥料時，每包都裝載六十包至七十包（每包四十公斤）；搬運稻米、雜谷時，每包裝載二十五包至三十包（每包一百公斤）；搬運水泥時，每包裝載五十包至六十包（每包五十公斤）。這樣裝載，比二公噸的三輪小汽車，實有過之而無不及。又如磚瓦工廠的牛馬車，每包最少載八百塊紅磚，最多也有裝到一千塊的。這種載重量，也是可以和三公噸的小卡車相比的。

其他的運輸業者，例如搬運水泥瓦的，無論道路好壞一律裝載八百塊到九百塊（每塊約四台斤），而且有時還為顧客的方便，加載水泥等其他建築材料。

至於農友們自己搬運稻谷，每包裝載四十包（每包一百台斤）也是尋常的事情。


朋友們！牛馬幫助各位耕田拖車，從不出怨言，請大家愛惜它們吧，無論牛車馬車，都不要超載！



，吉勒的醫校了聽
，桌持換光電改
，好（睛眼）目痛不骨腰
。（鑽稱）哇呵人良優績成



，緊要真光燈（書）冊讀
，掌亮頭足不線光
，身前向好最光燈
。面左照好最照要



，當適要低高桌椅
，康健響影無若
，功用難低椅高桌
。通鳴也低桌高椅