

怎樣種楊桃？

蔡致謨

楊桃栽培容易，本省各地都適於栽培，土壤宜稍稍濕潤的肥沃壤土。繁殖普通用實生法，優良品種用壓條或嫁接繁殖，嫁接於二年生實生砧上。於二月行切接，極易接活。苗木在苗床培養一至三年，高達〇·五至〇·七公尺時在早春定植，定植距離六×六公尺。

甜味品種有四種

楊桃的優良甜味品種有下列四種：

白絲餛飩：本品種在臺灣栽培已久，樹勢頗強，結果多，果實着生頗密，平均果重九六·五公分，長八·七公分，週徑一九·四公分，果皮粗糙，熟時淡橙黃色，香氣中等，果汁率（果汁重量佔總重量的百分率）五六·九九，糖分指數七〇，酸數四四，果汁每一百立方公分（cc）中含枸橼酸〇·三一，平均每果含種子一二·二粒。

臺灣甘味：為本省原有品種（在來種），樹勢甚強，着果頗密，果形小，平均果重三九·七公分，長五·七公分，週徑一四·一公分，熟時橙黃色，果面光滑，香氣濃郁，果汁率六八·〇〇，較其他品種為高，糖度六〇，酸數三九，枸橼酸量〇·二七，種子數二〇·四，品質頗佳。

爪哇：本品種出爪哇輸入，樹勢強，果實着生疏密中等，果形不大，平均果重六三·五公分，長七·七公分，週徑一五·五公分，果皮光滑，熟時淡橙黃色，香氣中等，果汁率五九·八四，糖分指數六·一，酸數二六，果汁每一百立方公分中含枸橼酸〇·一八，種子少，平均每果七·八粒。

廣東種：本種從廣東輸入。果實很小，平均重三三·四公分，長六·七公分，熟時淡橙黃色，果皮光滑，香味中等。果汁率五八·三一，糖度七·二，酸數三九，枸橼酸量〇·二七，平均每果含種子十粒。


修剪整枝不費工

楊桃都從老枝或本年生枝條上的不定芽萌發花序結果。苗木定植後，離地三十至四十公分剪截，讓其自然分枝，以後祇須剪除枯死枝及疏刪密生枝即可。

楊桃樹形整齊，即使不施修剪，樹形也不亂。

接後三年起結果

楊桃在嫁接後三、四年開始結實，花期自五月下旬起一直到十二月底，果熟期從七月中旬起直到第二年二月底，陸續有果實採收。如栽培得宜，二月中應有果實可以採收。



農藥的話就是 正豐農藥



A	農	愛	用						
	正	豐	巴	拉	松				(47%)
B	農	也	愛	用					
	正	豐	巴	拉	松				(47%)
C	農	又	是	愛	用				
	正	豐	巴	拉	松				(47%)
莫怪用過的人都說愛用									
	正	豐	巴	拉	松				(47%)
靈	嚇	地	安	安	馬				P
丹	必	特	巴	特	拉				M
乳	達	靈	乳	靈	松				乳
劑	乳	乳	劑	劑	劑				劑
15%	20%	18.5%	30%	19.5%	50%				50%

◎全省各鄉鎮農會農藥行均售
正豐化學股份有限公司
 住址：臺中縣霧峯鄉草湖路二號 電話：63
 連絡處：臺中市復興路四段三九號

保證效能、無效原金退還



牌東大

1%	25%	30%	10%	50%	50%	47%
殺	D	B	靈	馬	P	巴
鼠	M	M	丹	拉	M	拉
劑	劑	劑	劑	劑	劑	劑

竭誠服務、敬祈惠顧

售有均行藥農會農省全◎
 則細索函者意有商銷經地各求徵◎

廠工化東大

號七九段一路民三區西市中臺
 號七 七 六 四：話 電