

每年分二次施肥

楊桃結果株每株全年施肥量如下表所示 (單位：公斤)：

樹齡	堆肥	豆餅	過磷酸鈣	草木灰
八年生	三〇〇	二二四	一〇〇	三〇〇
十年生	四〇〇	二二五	一〇三	三〇六
十二年生	四四〇	二二八	一〇四	三〇九
十四年生	五二二	三三三	一〇八	三五〇
十六年生	六二二	三九九	一一一	三五五
十八年生	七〇〇	四〇四	一一三	三五九
二十年生	八〇〇	五〇四	一二〇	三六六
二十年以上	八八〇	六〇三	一二五	三七二

施肥時期一年二次；二月施全部堆肥和草木灰，九月施全部過磷酸鈣和豆餅。

△任何果苗的種植深度，都應該和該苗木在苗圃時一樣深淺，這是基本原則。沒有特殊的原因，不要培土。(蔡)

△梅通常用梅砧，如用李砧，也能接活，且接木後生長迅速，早入結果期，但樹齡較短，只有十數年。在本省，山地種梅比平地適宜。(蔡)

清河種子行春季優良種子

- 二尺半長紅仁白格菜 丸子晚生高脚波陵菜 美國文心窩豆
  - 幼葉種紅仁白格豆 正島頭種大號應菜 美國加州大粒甜椒
  - 黑仁青格菜豆 (紅蒂) 小號應菜 日本丸葉山東白菜 (尾)
  - 黑仁黑格菜豆 (黑鱗) 日本黑葉美濃大根 紅肉崎頂西瓜
  - 究尾大號韭菜 日本長岡交配大形福 日本高級草花種子
  - 正全年開花韭菜 美國派遜トマト 特大葉虎耳多荷
  - 青皮目瓜 (胡瓜) 日本長岡交配一號甘 早春35天包心白菜 (黑仁嫩豆)
  - 白仁嫩豆 日本長岡理想結球白 下種後十日起開始
  - 青江白菜 日本長岡理想結球白 交種，種子量有限
  - 正晚生白菜白骨芹菜 美國新大五寸人蔘 扁甲芥菜子
- 請提早訂購

清河種子行

號四八五三話電 號二八四路正中市義嘉  
號七三〇〇八第字嘉金儲撥劃  
口場市發批菜菓新鎮林員經處銷部中  
行子種蓮金  
號五四八〇二第字中金儲撥劃行子種蓮金

一致養雞·豬·鴨的各農家的好消息

防治貴家禽畜疾病、把牠們  
餒肥養大、增產優良的蛋·肉

這就是增加貴家收入唯一的近路！

費用僅小，用法簡便——ロメジンソーダ與ベキシン只要溶於禽畜的飲料水或混入飼料中就可達成目的。請立刻試用。

最新禽畜驅虫藥

預防/治療，雞病的特效藥

動物用

動物用



禽畜也和人一般，體內若有蛔虫寄生，決不能肥大。請把ベキシン每月一次定期的給貴家禽畜吃而看牠們一天比一天的肥大。  
【包裝】 30公分，100公分，500公分。

對家雞應染的一切疾病有顯著優秀的功效。雞在雞時尤易染病，這時期給與ロメジンソーダ，預防的效果更大。  
【包裝】 50公分，100公分，100片裝



國通製藥

全島有名藥店發售