

的盛旺液漆成造樣怎

林漆南安

—可宗李—

安南漆
在北

部十月間採取種籽，可以直播在造林地上；但二月間植樹造林用的苗木，要在前一年的三四月間播種。臺灣的南部在五

月至九月間播種，可供做第二年出山植樹造林用的苗木。播種前，先作成四尺寬的床畦。播種量每坪五勺，均勻撒播，然後覆蓋細土約五分，再均勻被覆切短的草葉或糠殼等。種籽浸水不可太久，以免影響發芽率。每升種籽約三萬五千粒，普通發芽率約五〇%。發芽後要間拔四—五次，如發現有「赤芽」的變種，馬上拔去。苗高二—三寸時換床，並按時灌水，每坪床畦上可育成苗木二百株。

臺灣的北部以二月間造林最好，但三、四、五月間如有適當的雨量，也可植樹造林。安南漆造林的植穴，應該盡量的寬大，直徑約一、五尺左右，植穴掘到一尺深度時，要把穴內的土壤弄碎，除淨雜物。經過一次落雨後，就可栽

植。

樹苗植在植穴的中央位置，稍深，保持莖部和根部自然姿態，根部不可彎曲。植後墾入七分厚的細土，同時用手指握著莖部微微向上提直。隨後把堆放在穴內的肥沃表土，壅蓋在穴內的細土上層，再把穴中根株周圍的土壤，用手掌輕壓。最後在穴圍根緣部分，覆蓋落葉或草類。在地上壅四—五寸的部位，作適度的剪定。苗木定植二—三星期後，開始發出新芽。新芽萌發三—四個，長達二寸的時候，就留著最完好的新芽一個，其餘的都要除去。接近根部如有萌芽，就應及早剪去。幼木枯死的，應該馬上補植。

傾斜地造植漆林，要順著植株間栽培銀合歡或黃野百合等綠肥成橫帶狀。可以防止表土的流失，並促進苗木生長良好。

荒廢地安南漆造林，除在第一年栽培綠肥外，幼木的新芽長到三—四寸時，在距離每一植株根部五—六寸的地方，施用硫酸一八·七五公分。

造林地如發現有彎曲形的樹幹，就應馬上剪定，或除去牠彎曲的部份，實行萌芽更新，成為端直的樹幹。

造林後第一年樹高通常四—五尺，需刈草三次，按時刈取綠肥，剪定樹枝。第二年樹高通常七—八尺，刈草兩次，及時刈取綠肥，綠肥如為黃野百

合，應在開花期刈取，才可收到肥效。樹幹下部的枝也要作適度的剪定，並使牠的切口早日癒合。如到採漆期，切口部份還沒有癒合時，要好好保護。第三年樹勢發育健旺，只需刈草兩次，但漆樹枝幹從地上起六尺以下的枝梗，需要全部除盡，才可使樹冠擴張良好。幹高超過十二尺以上的，要作適高的剪定。

年七至九月間，常有避債蟻，金龜子，捲葉蟲等為害，可用石油乳劑噴佈防除。發育旺盛的漆樹，幹部柔軟，在造林地稍高的地方，要栽植竹類或相思樹數行，以防風害。在冬期季節風直衝的地帶，應種植抗風力強的防風林木。

＊ ＊ ＊

庭園種植龍柏可作觀賞樹木

問：一、日本名稱爲イブキ樹，我國稱爲何樹？二、該樹樹幹有何用途，據聞可製成香料，是否確實，又所製成的香料用途如何？三、該樹在本省何地種植最多有否野生？（彰化和美李江仲）

答：一、日文的カイヅカイブキ中名爲「龍柏」。二、龍柏通常栽作庭園觀賞用並無其他用途。三、龍柏在本省無野生者，但全省到處可看到栽培於庭園中。（文鎮）

芳樟	二月—四月	苗栗、高雄縣及基隆市。
臺灣檉	一月—三月	苗栗縣。
可可椰子	二月—六月	屏東縣。
刺竹	二月—三月	彰化縣，高雄縣。
長枝竹	二月—三月	臺中、南投縣。
泡桐	二月—三月	南投縣。

上項各種苗木及種子，是免費分配各機關團體，及一般造林者。各地農友如希望造林，請把握造林適期，提早到林地所在地的鄉鎮公所填表申請。

造林者領苗木前，應先把林地整地完成，領到苗木後，應儘快運到林地種植。如因數量太多，不能立刻種完，應即選擇有庇蔭的地點，先行假植。

造林後，縣市政府將派員測量實際造林面積，並檢查成活率及撫育管理情形。造林者請領的種苗數量，應該與實際需要符合，不可浪費。造林後尤應注意刈草撫育。造林成績優良的團體或個人，將在植樹節時得到褒獎。

各縣山區鄉鎮，都設有示範林，作為公私有造林及林地經營的模範。各位造林者，可以隨時參觀。

