

一、第一雛育・鶏火養飼

水 金 鄉

飼養火雞是目前農村副業之一。可是如果飼主不明瞭飼養方法，疫病防治和管理要點，火雞便易患病死亡，遭受損失。筆者認為飼養火雞，以育雛期（出生後八週內）為最重要，謹將個人的一些經驗寫出，供農友參考。

用育雛箱保溫育雛

小火雞必需用育雛箱保溫。飼育十至二十隻的小火雞時，育雛箱面積應爲寬二至二·五臺尺，長一·五臺尺，高一至一·五臺尺即可。如育雛三十至五十隻，則箱寬二·五至三臺尺，長四至五臺尺，高一·五臺尺左右即够。製箱材料大部份都用木材，惟箱底用鐵絲網，以使清掃雞糞方便。箱蓋則須用細網，以防蚊蟲獸畜侵害。育雛箱內以三分之一作保溫室，另三分之二爲小火雞活動地帶。如果飼育火雞數目不多，可用電泡（天寒時用一百燭光燈泡，溫暖時用六十燭光燈泡。）作保溫。能容納五十隻以上的育雛箱最好特別裝設發熱器保溫，以策安全。開始飼養前，所有飼育用具應行徹底洗滌消毒後才得使用。

小火雞固然須要保溫，但溫度太高太低都不好，溫度太高則小雞張嘴，多飲水，離開保溫室，反之則彼此擠集哀鳴。只有在適當溫度條件下，才會使小雞舒暢活潑。箱內還應備足清水，供小雞自由飲用，或補箱內濕度之不足。保溫期間尤須注意箱內空氣之流通，且要防止室外冷風之吹入。

多給青菜與魚粉等

小火鷄給餌時期可能要比一般小鷄來得早一點，依筆者之經驗，孵出一天後如能開始啄食飼料時，即可開始給餌。

火鷄喜吃青菜（尤如葱類、白菜、鵝菜），這些青菜類應特別細切到能被嚥下程度，並與飼料攪拌均勻，散於舊報紙上，以便小火鷄啄吃。給餌第五天後可改用小飼槽。給飼次數一至八星期中每日五至六次，八至十二星期中每日四至五次，十三星期後改爲三次給與之。小火鷄所需粗蛋白質量較一般小鷄高，所以在普通鷄飼料中，要另加魚粉或脫脂乳粉、大豆餅、花生餅類等。（亦有用豆腐飼火鷄者，但量應少且要新鮮，否則影響消化）。飼料配合標準如下表所示（次頁）。


初孵出的小火雞只能吃粉餌，十二星期後始可飼給粒餌。青飼料必須佔飼料給與量之百分之三十至四十。飲水應隨時充份供給。

日常管理注意十點

①每日早晨餵飼前，育雛箱應清掃乾淨，水槽飼槽也應洗淨。

②保溫期間長短，應視氣候情形酌予調整加減，但是小火雞耐寒性很弱，一旦感冒容易引起下痢。

③一次飼料混合則量不可太多，否因放置太久容易變質，小火雞吃後會引起消化不良等疾



農會金庫提去寄

小顧圖

病。

- ④各種飼料要特別選擇新鮮且質良者。飼料變更要逐漸改換，不可忽然完全改換。
- ⑤氣溫大寒應想辦法增加溫度，使小火雞發育正常。
- ⑥青葱或蕃椒類之刺激性飼料應時常飼給，以促進小火雞的消化作用。
- ⑦一個月左右的小火雞因已漸次開始第一次換毛，飼料品質應特別注意，管理也要細心。
- ⑧雨季或多濕時，應設法使育雛箱乾燥清潔，並注意通風與光線問題，還要避免冷風吹襲。
- ⑨雨後不可放飼於舍外，免得受涼致病。（如患軟腳症、感冒、下痢）
- ⑩給餌一星期後如天氣晴朗時，可放於太陽下自由活動，以增雞體健康。
- ⑪離溫後白天放飼於舍外自由活動，夜晚要趕進舍內，到兩個多月時舍內應設棲架。

預防瘟疫隔離病雞

育雛應特別注意預防疫病和隔離病雞。比較常見之疫病如下：

球蟲病 常見於兩個月上下的小火雞，主要病徵為食慾減退，精神不振，下血便，死亡率不太高，治療方法是 *Sulfaguanidin* 或 *Sulfamethiazin* 〇·五% 摻入飼料內連續餵飼三天，開隔一、二天再以同法給飼，直至雞隻完全復原為止。

軟腳症 飼料中維他命或礦物質類不足均能引起軟腳症。所以日常飼養管理上需注意飼料合理配合，光線充足，不密飼，通風適當等。治療時可用綜合維他命乙注射，及多給榮養豐富的飼料。

雞痘 小火雞比一般的雞容易感染雞痘，通常一至二個月左右感染率最高，死亡率也高，其症狀為頭部肉髯，頸面無毛處之皮膚上生大小不同的豆狀痂皮，而腫脹或呈水泡性濃液。此症以藥物治療收效甚微，如果將雞痘痂皮稍加剝落，用硼酸水或過錳酸鉀洗滌，再塗上碘酒及尼西林軟膏，每日兩次繼續數天，或有治療希望。本省目前有效預防疫苗可行接種，接配種後可免感染（方法請參閱豐年第十卷第八期）

黑頭病 主要症狀為下痢，或帶黃白色軟便及排泄褐綠色粘液，有臭氣。嚴重者死亡率達五〇—七〇%左右；成雞死亡率較低。到目前為止未見有特效安全藥物可治療。只有在小火雞飼育期間，注意育雛箱或舍內外的清潔與消毒，勿與成雞接觸，則可減少感染機會。

消化不良症 保溫期間溫度不適當，飼料品質不良或發霉，以及給與飼料不規則，均能引起消化不良。初則下痢，繼則排泄乳白色粘液，食慾減退，終至虛弱死亡。治療的藥物與球蟲病同，此外尚可用地黴素溶性粉劑一茶匙溶於一加侖水中或添加於二·五公斤的飼料中連續飼餵一二天即可。

雞飼料	花生餅	魚上粉等	貝殼粉	食鹽	乳脫粉	脂粉	抗生素	魚肝油	計
八星期	四	一六	一四	一八	二五	〇五	五〇	〇七	一〇〇
九—十二星期	四	一七	一三	一六	二五	〇五	五〇	〇七	一〇〇


註：穀類：包括玉米、小麥或碎米等。
魚粉：應包含六〇%以上粗蛋白質。
糠類：包括麩皮、脫脂米糠或麥糠。
抗生素：益生素或地黴素補助飼料。



，單簡也款存行銀
，限無是少多入存
，辦時即寄去錢有
。（心安）安肝心內層較比



，整名好款存錢有
，寄去提庫金作合
，領以可用要時隨
。驚免全安在實



，意注着錢有內層
，（用何）平下是錢伴環手
，去偷來行賊（怕不）驚免