蟲（蛔蟲、糞桿蟲、鞭蟲）蟲卵，二、三星期的仔豬舐食豬舍內污物，吃入蟲卵感染寄生蟲，因併發胃腸炎而引起白痢。

細菌感染　仔豬舐食飼槽內外腐敗飼料及被細菌污染飼料，大腸菌侵入體內，而發生白痢。這種情形比較嚴重，仔豬容易致死。

飼料配合不妥　仔豬出生後四星期左右，就開始吃飼料。此時飼料如配合不適當，引起消化不良，結果排出褐色軟便，發生下痢。

預防方法

一、注意猪舍衛生

猪舍內床面必須乾淨，飼槽內不可存腐敗飼料。

二、注意預防感冒

猪舍內放稻草，尤其是氣候轉變時期或冬季要多放。並防止冷風侵入。

三、改換飼料．多給牧草

因爲母猪脂肪質飼料（糠類、穀類、穀類）飼給過多而發生仔猪白痢的，要減少飼料份量，多給牧草或青草，供給豐富的維他命以增進母乳的品質。

四、充份補給鈣分

吃濃厚飼料的母猪，乳汁酸性較多。所以在分娩前後及哺乳期中，應充分補給鈣分，其配合率爲飼料的百分之二．五至三。

五、給與合理的飼料

仔猪出生後四至六天中的哺育飼料及配合量要合理，其配合例如左表。

番薯簽最好煮後混合其他飼料喂給，如用番薯要加四倍量。

例	番薯簽	鉄皮	糠類	脂肪米	玉米粉	豆餅粉	粉	脂肪乳	魚粉	骨粉	炭酸鈣或	塩	益生素
1	三〇	二〇	二〇	一〇	一〇	一〇	五	五	五	二—二．五	〇．五	〇．五
2	二〇	一〇	二〇	一五	一五	一〇	五	五	五	二—二．五	〇．五	〇．五
3	二〇	二〇	二〇	一五	一五	一〇	五	五	五	二—二．五	〇．五	〇．五

治療方法

上述飼養管理改善後，如仍發生仔猪白痢，就要用藥品治療。

一、如因母猪飼料不適當而引起，則可試用重曹。

一次給三十至四十公分，連用二至三日。

二、病症較輕者可於飼料中加百分之五的益生素

三、重症可喂用或注射下列藥劑：

①磺胺呱啶一．五，重量曹三．〇次硝四．〇，糖水少量，混合爲舐劑，一頭分一日三回分服。

②注射劑則用一〇％磺胺劑筋肉注射，體重每公斤一．五至二立方公分(c.c.)，一日一回。

由母猪患病起因及寄生蟲、細菌性感染者，均需延請獸醫診治較妥。

ORTHO®

美國好速牌農藥

積五十餘年經驗．供献全世界農民

現貨供應・歡迎採購
美國原裝・分裝小瓶

ORTHO Endrin 1.6 Emulsire

好速牌安特靈乳劑

防治：棉花—紅鈴蟲、金鋼鑽等等
大豆—各種主要害蟲
水稻—螟蟲

總經銷處：東益貿易股份有限公司
臺北市天水路二號　電話 43802

經銷處：建南農藥行
嘉義市中正路452號　電話 2198

好速巴拉松50％　阿特靈乳劑
(好速福乳劑42％)　阿特靈乳劑
馬拉松乳劑　富賜靈乳劑
安特靈乳劑　大勃隆乳劑
阿特靈40％可濕性粉劑
地特靈50％可濕性粉劑
好速殺50％水和性粉劑
法爾丹50％可濕性粉劑
滅蝸藥（片狀及粒狀）
以及其他各種農藥應有盡有

中部經銷處：正豐化學公司
臺中縣霧峯鄉草湖路二號　電話 63

總代理：嘉農股份有限公司
臺北市長安東路二段14號　電話46915
臺北聯絡處：臺北市重慶北路三段70巷50號　電話46504
臺中聯絡處：臺中市復興路四段39號