

# 功成否能瓜胡作春

## 術技苗育床溫靠全

——生進王——

### 早春栽培胡瓜(刺瓜)

要在立春前後兩星期內開始育苗，才能够趕上早期市場的需要，賣得好價錢。今年立春是國曆二月四日(農曆十二月十九日)，在這時期前後，臺灣北部地區還在雨季當中，天氣也很冷，本不適合於胡瓜的發芽生長，但如巧妙的應用塑膠布保溫育苗的方法，注意苗床管理，育成健壯的胡瓜苗，春作胡瓜的豐收，也是沒有什麼困難的。

### 為什麼要溫床育苗？

胡瓜必需在立春前後二星期內着手育苗，可是胡瓜發芽的適當溫度，是攝氏(C)二十至二十五度，本省北部地區立春前後的室外氣溫，不可能有這樣高的溫度，而且因為還在雨季當中，播種後如遇到連續的陰雨，可能使胡瓜種子全部腐敗，為了保證豐收，必須要應用塑膠布保溫育苗的方法。

### 怎樣準備溫床？

材料 胡瓜苗的生長期，並不需過高的溫度，所以利用稻稈做床框，上面覆蓋塑膠布，已經可以得到很好的效果。

溫床中的醱熟物，可用新鮮堆肥，或稻稈均可。應用稻稈時，每一百公斤稻稈加硫酸銨三·五公斤。硫酸銨加水溶解後，澆在稻稈上，用腳踏實，就可以發酵生熟。

### 面積


栽培春作胡瓜十公畝(一分地)，約需胡瓜苗二千四百至二千六百株，育苗的行株距離如為九×六公分，苗床面積就需要十八平方公尺。例如床寬一·二公尺時，畦長應為十五公尺。

### 育苗的步驟和方法

消毒·催芽 種子裝入布袋，浸在「烏斯普龍」(ウスプルン)的一千倍溶液中約一小時，然後浸入攝氏(C)二十五度的微溫水中約四至五小時。

在淺底木箱中裝入河砂，充分灌水，使砂面均平結實並含有充足水份。全部種子播在砂面後，再用新的草蓆覆蓋。然後將木箱放在攝氏四十五至五十度的堆肥中，並用溫度計插入砂中，隨時調節溫度，不可超過攝氏三十度，約經四十八小時後，即可全部發芽。

播種 將發芽之種子(剛剛開始萌芽者)播於稻稈框塑膠布溫床內，或用燒土或草木灰與土之混合物於種子上面約蓋一公分厚。採用條播為宜，條與條之間(行間)八至九公分，株與株間六至七公分即可。床土宜用腐熟堆肥與充分風化之田土各半混合者，厚度約十至十二公分。



床苗溫保的成做布膠塑與稈稻用利

### 防治病蟲勿傷子葉

①早晚灌水一次，水分不可過多，儘量避免澆在子葉上面，千萬勿傷子葉。子葉完整即表示生長健全。

健全。

- ②子葉展開二、三天後本葉開始生長，於本葉半展開時開始噴射「大生」四百倍液預防露菌病及炭疽病之發生。如有好蟲發生宜用魚藤精驅除。
- ③白粉病可用「可利生」或硫黃藥防治。
- ④預防立枯病之發生每隔七天於傍晚時用六百倍「烏斯普龍」液澆於根際，此時不需另行灌水。
- ⑤溫度較暖時除去塑膠布蓋，儘量曝曬於陽光使苗株硬化，但下雨天須即再蓋。本葉三、四枚時即可定植，不必經過假植。

### ☆慶☆祝☆農☆民☆節☆

敝行特選優良春季種子供應栽培

- 二尺半長紅仁白格菜豆
- 幼葉種紅仁白格目豆
- 黑仁青格菜豆(紅蒂目豆)
- 黑仁黑格菜豆(黑鰭魚)
- 突尾大號韭菜
- 正全年開花韭菜
- 青皮目瓜(胡瓜)
- 黑仁嫩豆
- 白仁嫩豆
- 八十天油甘菜
- 白杏菜(虎耳菜)
- 正晚生白菜白骨芹菜
- 丸子高脚晚生菠菜
- ミस्ताウ下波薩
- 正烏龍種大號應菜(空心菜)
- 大號應菜(空心菜)
- 小號應菜(空心菜)
- 其它種子在庫均備，菌病特效藥大生，大生22，可利生，殺蟲特效藥，植物荷爾蒙，本行經售；日本東邦化學產業株式會社出品，最新植物綜合微量要素，葉面散布劑サム，施肥劑ハイグリ
- 梨仔瓜(黃香瓜)
- 早春35天包心白菜(交春)
- 後十日起開始下種，種子量有限請提早訂購
- 海黑仔紅肉西瓜
- 日本高級草花種子
- 特大葉虎耳冬荷
- 甲芥菜
- 美國派遜トマト
- 日本長岡一號甘藍
- 日本長岡理想結球白菜
- 美國新型大五寸人參美國
- 美國加洲大粒甜椒
- ロビキング大粒甜椒
- 日本丸葉山東白菜(一條根)

### 清河種子行

嘉義市中正路四八二號 電話：三五八號

### 金蓮種子行

劃撥優金嘉字第八〇〇三七號  
 中部經銷處經員林鎮新菓菜批發市場口  
 金蓮種子行劃撥儲金中字第二〇八四五號