



卵雞 需要安 靜 不宜 遷移 雜

如果

將一群不 受驚擾的 卵雞和另 一群四周 喧鬧的卵 雞相比較 時，前者

可以生百分之卅的蛋，體重也見增加，後者的體重則下降，產卵不佳。這是美國肯薩斯大學的試驗結果。

基於上述的發現，卵雞在管理上應採取下列幾點的措施：

一、一群卵雞應終生飼養在同一個雞舍內，避免更換環境，或在中途混入新的雞隻。

二、多放幾個飼料器和給水器在雞舍裏，使頸啄較短的雞在爭食飼料時，也能得到所需的飼料飲料。

三、在普通情況下，避免將雞群從甲雞舍遷移到另一雞舍，如果必須將不同的雞群併合在一個雞舍中時，也應該挑選大小一致者混在一起。(World Farming, 60)

新製新城雞瘟疫苗

有效期長免疫完全

加州大學已經製成了一種接近理想的新城雞瘟疫苗，此種新疫苗，第一次注射後的有效期間至少為十三星期，第二次注射後的有效期間至少為

五十三星期。

此種新疫苗具有完全的和長期性免疫能力，任何大小雞隻都可以接受新疫苗的注射。對於從未接受預防注射或體弱的雞，不會產生不良反應，或誘發潛伏在雞隻體內的其它疾病。(World Farming, June, 60)

驅除綿羊線蟲

可用含鎢藥品

寄生在綿羊體內的線蟲，能够抵抗多種殺蟲藥劑，現在可以利用若干種鎢的混合物來防除了。

根據依利諾大學獸醫學院的報告，這些鎢的化合物，原是用來防治豬蛔蟲的藥品，現在則可成爲驅除綿羊寄生蟲的有效藥劑。

供作實驗的綿羊，接受了各種不同數量的碘化鎢、氧化鎢、和氯化鎢的處理之後，在三個月或四個月內，可免除寄生蟲的傳染。不過這些藥物的處理，必須注意平衡，以防體重的可能降落。綿羊因接受鎢的處理，其體重常會減輕四磅至六磅。

線蟲雖不至於致綿羊於死，但可使小羊衰弱，導致痢疾及阻礙發育。一年生的綿羊感染了寄生蟲後，常能自動產生一種免疫性，然而較年長的綿羊則失去此種免疫能力，且易將線蟲的卵傳染給小羊。(World Farming, June, 60)

氮素施入土中

未能全部生效

美國的土壤研究專家們，最近發現氮素化學肥料施入土中，經過兩年之後，能被作物所吸收者，僅佔其全部施用量百分之廿；能够殘留在土中



五豐化學工業股份有限公司

與德國拜耳藥廠瑞士嘉基公司技術合作在臺獨家配製

公司：臺北市中正路1791號二樓

電話：31691

工廠：北基公路七堵草蓋站旁

電話：七堵36號

Folidol-E605

富粒多

1000 cc
250 cc
鋁瓶裝

現貨應市

巴拉松
乳劑

大利農
乳劑

螞蟻藥

馬拉松
乳劑

安特靈
乳劑

克羅本
乳劑

魚寶

家虫敵

經銷處

- | | | |
|-----------------|----------|----------|
| ① 臺北市迪化街 | 臺灣農產企業公司 | 電話：44253 |
| ② 桃園縣中正路103號大豐後 | (農友行) | 電話：743 |
| ③ 新竹市中華路226號 | 青果合作社 | 電話：25 |
| ④ 新竹市中華路184號 | 新竹農產行 | 電話：938 |
| ⑤ 苗栗後龍中正路55號 | 源和西藥行 | 電話：6 |
| ⑥ 臺中市三民路114號 | 信全農藥行 | 電話：3343 |
| ⑦ 員林中山路229號 | 信全農藥行 | 電話：184 |
| ⑧ 南投草屯中山街 | 隆泰行 | 電話：155 |
| ⑨ 雲林縣北港民生路59號 | 聯發建材行 | |
| ⑩ 雲林縣斗南鎮新興街30號 | 永豐農藥資材行 | 電話：174 |
| ⑪ 嘉義市中山路257號 | 新高藥局 | 電話：2964 |

- | | | |
|----------------|--|--|
| ⑫ 臺南市東門路140號 | | |
| ⑬ 高雄縣鳳山鎮第二市場內 | | |
| ⑭ 高雄縣大樹鄉溪脚村42號 | | |
| ⑮ 高雄縣美濃鎮合和里11號 | | |
| ⑯ 屏東潮州中山路69號 | | |
| ⑰ 屏東萬丹鄉萬安村69號 | | |
| ⑱ 屏東市廈門街64號 | | |
| ⑲ 臺東鎮更生路192號 | | |
| ⑳ 臺南市西門路44號之1 | | |
| ㉑ 臺南縣佳里鎮文化路31號 | | |

- | | |
|---------|-----------|
| 永豐農藥行 | 電話：4971 |
| 農友種子行 | |
| 順昌商行 | |
| 傳榮農藥資材行 | |
| 中德藥行 | |
| 萬安藥房 | |
| 嘉興行 | |
| 農友供應社 | |
| 和美米行 | 電話：臺南9389 |
| 瑞美號 | 電話：佳里112 |